

Zahnmedizin 9.1 Questions préopératoires et instructions post-opératoires

Präoperative Fragen und postoperative Anweisungen



1. Pourquoi le dentiste anesthésie-t-il la zone avant l'extraction ?
 - a. Pour éviter toute infection
 - b. Pour que l'intervention soit indolore pour le patient
 - c. Pour empêcher le patient de parler pendant l'opération
 - d. Pour rendre la dent plus blanche
2. Que fait le chirurgien après l'incision de la gencive ?
 - a. Il retire la dent sans autre manipulation
 - b. Il soulève un petit volet gingival
 - c. Il donne un anesthésique oral au patient
 - d. Il pose immédiatement un fil résorbable

1-b 2-b

2. Lesen Sie den Dialog und beantworten Sie die Fragen.

Extraction dentaire et saignement chez un patient sous anticoagulants

Zahnextraktion und Blutung bei einem Patienten unter Antikoagulationen

- Patient:** Docteur, je prends des anticoagulants. Est-ce que je vais beaucoup saigner ? *(Doktor, ich nehme Blutverdünner. Werde ich stark bluten?)*
- Dentiste:** Ne vous inquiétez pas, nous prendrons toutes les précautions nécessaires pour avoir une bonne hémostase. *(Machen Sie sich keine Sorgen, wir treffen alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen, damit eine gute Hämostase erreicht wird.)*
- Patient:** Quel type d'anesthésie allez-vous utiliser ? *(Welche Art von Anästhesie werden Sie verwenden?)*
- Dentiste:** Nous utiliserons une anesthésie locale à base d'articaine. Cela va aussi aider à réduire le saignement dans la zone chirurgicale. *(Wir verwenden eine lokale Anästhesie auf Articain Basis. Das hilft auch, die Blutung im Operationsgebiet zu verringern.)*
- Patient:** Et comment allez-vous contrôler le saignement ? *(Und wie kontrollieren Sie die Blutung?)*
- Dentiste:** Nous placerons une éponge hémostatique dans l'alvéole et nous ferons quelques points de suture pour assurer une bonne coagulation. *(Wir legen einen hämostatischen Schwamm in die Alveole und setzen einige Nähte, um eine gute Blutgerinnung zu gewährleisten.)*
- Patient:** Et après l'intervention ? *(Und nach dem Eingriff?)*
- Dentiste:** Je mettrai une compresse que vous devrez mordre pendant trente minutes. *(Ich lege eine Kompresse an, die Sie dreißig Minuten fest aufbeißen müssen.)*
- Patient:** Que dois-je faire si je saigne encore ? *(Was soll ich tun, wenn ich noch blute?)*
- Dentiste:** Vous remettez une autre compresse et vous mordez encore pendant trente minutes. Si le saignement persiste, vous revenez à la clinique. *(Legen Sie eine weitere Kompresse an und beißen Sie erneut dreißig Minuten. Wenn die Blutung anhält, kommen Sie bitte wieder in die Klinik.)*

Patient: Merci beaucoup, docteur.

(Vielen Dank, Doktor.)

Dentiste: Je pourrai aussi placer une compresse avec de l'Amchafibrine pour arrêter le saignement. Ne vous inquiétez pas.

(Ich könnte auch eine mit Amchafibrin getränkte Kompresse einlegen, um die Blutung zu stoppen. Machen Sie sich keine Sorgen.)

1. Que prend le patient comme médicament ? *(Welches Medikament nimmt der Patient?)*
 - a. Il prend des somnifères.
 - b. Il prend des antibiotiques.
 - c. Il prend des antalgiques.
 - d. Il prend des anticoagulants.
2. Quel type d'anesthésie la dentiste va-t-elle utiliser ? *(Welche Art von Anästhesie wird die Zahnärztin verwenden?)*
 - a. Aucune anesthésie, seulement une compresse froide.
 - b. Une anesthésie locale à base d'articaine.
 - c. Une sédation intraveineuse profonde.
 - d. Une anesthésie générale à l'hôpital.

1-d 2-b