

Zahnmedizin 9.1 Questions préopératoires et instructions post-opératoires



Präoperative Fragen und postoperative Anweisungen

<https://app.colanguage.com/de/franzoesisch/dialoge/questions-preoperatoires>

1. Sehen Sie sich das Video an und beantworten Sie die zugehörigen Fragen.

Video: https://wwwyoutu.be/L7GO7Wi6l_s

Arracher une dent de sagesse	(Einen Weisheitszahn ziehen)	Un levier	(Hebel)
Anesthésier	(Betäuben)	Les racines	(Die Wurzeln)
Incision de la gencive	(Schnitt ins Zahnfleisch)	Enlever les débris osseux	(Knochenreste entfernen)
La dent est enfouie dans l'os	(Der Zahn ist im Knochen verlagert)	Une éponge hémostatique	(Ein hämostatischer Schwamm)
Creuser l'os pour accéder à la dent	(Knochen abtragen, um Zugang zum Zahn zu erhalten)	Un fil résorbable	(Ein resorbierbares Nahtmaterial)

1. Pourquoi le dentiste anesthésie-t-il la zone avant l'extraction ?
 - Pour rendre la dent plus blanche
 - Pour empêcher le patient de parler pendant l'opération
 - Pour éviter toute infection
 - Pour que l'intervention soit indolore pour le patient
2. Que fait le chirurgien après l'incision de la gencive ?
 - Il soulève un petit volet gingival
 - Il pose immédiatement un fil résorbable
 - Il donne un anesthésique oral au patient
 - Il retire la dent sans autre manipulation
3. Dans quel cas faut-il creuser l'os pour accéder à la dent ?
 - Quand la gencive est saine
 - Quand le patient est allergique aux anesthésiques
 - Quand la dent est enfouie dans l'os
 - Quand la dent est déjà sortie
4. Quel est le rôle principal de l'éponge hémostatique pendant l'intervention ?
 - Anesthésier la zone
 - Nettoyer la bouche du patient
 - Aider à contrôler le saignement dans la zone opérée
 - Remplacer la dent retirée

1-d 2-a 3-c 4-c

2. Lesen Sie den Dialog und beantworten Sie die Fragen.

Extraction dentaire et saignement chez un patient sous anticoagulants

Zahnextraktion und Blutung bei einem Patienten unter Antikoagulanzen

Patient: Docteur, je prends des anticoagulants. Est-ce que je vais beaucoup saigner ?	(Doktor, ich nehme Blutverdünner. Werde ich stark bluten?)
Dentiste: Ne vous inquiétez pas, nous prendrons toutes les précautions nécessaires pour avoir une bonne hémostase.	(Machen Sie sich keine Sorgen, wir treffen alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen, damit eine gute Hämostase erreicht wird.)
Patient: Quel type d'anesthésie allez-vous utiliser ?	(Welche Art von Anästhesie werden Sie verwenden?)
Dentiste: Nous utiliserons une anesthésie locale à base d'articaïne. Cela va aussi aider à réduire le saignement dans la zone chirurgicale.	(Wir verwenden eine lokale Anästhesie auf Articain Basis. Das hilft auch, die Blutung im Operationsgebiet zu verringern.)
Patient: Et comment allez-vous contrôler le saignement ?	(Und wie kontrollieren Sie die Blutung?)
Dentiste: Nous placerons une éponge hémostatique dans l'alvéole et nous ferons quelques points de suture pour assurer une bonne coagulation.	(Wir legen einen hämostatischen Schwamm in die Alveole und setzen einige Nähte, um eine gute Blutgerinnung zu gewährleisten.)
Patient: Et après l'intervention ?	(Und nach dem Eingriff?)
Dentiste: Je mettrai une compresse que vous devrez mordre pendant trente minutes.	(Ich lege eine Komresse an, die Sie dreißig Minuten fest aufbeißen müssen.)
Patient: Que dois-je faire si je saigne encore ?	(Was soll ich tun, wenn ich noch blute?)
Dentiste: Vous remettez une autre compresse et vous mordez encore pendant trente minutes. Si le saignement persiste, vous revenez à la clinique.	(Legen Sie eine weitere Komresse an und beißen Sie erneut dreißig Minuten. Wenn die Blutung anhält, kommen Sie bitte wieder in die Klinik.)
Patient: Merci beaucoup, docteur.	(Vielen Dank, Doktor.)
Dentiste: Je pourrai aussi placer une compresse avec de l'Amchafibrine pour arrêter le saignement. Ne vous inquiétez pas.	(Ich könnte auch eine mit Amchafibrin getränkte Komresse einlegen, um die Blutung zu stoppen. Machen Sie sich keine Sorgen.)

1. Que prend le patient comme médicament ?

- a. Il prend des antibiotiques.
- c. Il prend des anticoagulants.

- b. Il prend des antalgiques.
- d. Il prend des somnifères.

2. Quel type d'anesthésie la dentiste va-t-elle utiliser ?

- a. Aucune anesthésie, seulement une compresse froide.
- c. Une anesthésie générale à l'hôpital.

- b. Une sédation intraveineuse profonde.
- d. Une anesthésie locale à base d'articaïne.

1-c 2-d

3. Quels sont les facteurs de risque et les mesures préventives que vous discutez avec un patient avant une extraction dentaire afin de réduire le risque de complications

postopératoires ?

1. <https://www.dentaly.org/extraction-dentaire-tout-savoir-avant-de-se-faire-arracher-une-dent/>