

Zahnmedizin 9.1 Questions préopératoires et instructions post-opératoires

Präoperative Fragen und postoperative Anweisungen



1. Sehen Sie sich das Video an und beantworten Sie die zugehörigen Fragen.

Video: https://www.youtube.be/L7GO7Wi6l_s

Arracher une dent de sagesse	<i>(Einen Weisheitszahn ziehen)</i>	Un levier	<i>(Hebel)</i>
Anesthésier	<i>(Betäuben)</i>	Les racines	<i>(Die Wurzeln)</i>
Incision de la gencive	<i>(Schnitt ins Zahnfleisch)</i>	Enlever les débris osseux	<i>(Knochenreste entfernen)</i>
La dent est enfouie dans l'os	<i>(Der Zahn ist im Knochen verlagert)</i>	Une éponge hémostatique	<i>(Ein hämostatischer Schwamm)</i>
Creuser l'os pour accéder à la dent	<i>(Knochen abtragen, um Zugang zum Zahn zu erhalten)</i>	Un fil résorbable	<i>(Ein resorbierbares Nahtmaterial)</i>

1. Pourquoi le dentiste anesthésie-t-il la zone avant l'extraction ?
 - a. Pour éviter toute infection
 - b. Pour rendre la dent plus blanche
 - c. Pour que l'intervention soit indolore pour le patient
 - d. Pour empêcher le patient de parler pendant l'opération
2. Que fait le chirurgien après l'incision de la gencive ?
 - a. Il pose immédiatement un fil résorbable
 - b. Il donne un anesthésique oral au patient
 - c. Il soulève un petit volet gingival
 - d. Il retire la dent sans autre manipulation
3. Dans quel cas faut-il creuser l'os pour accéder à la dent ?
 - a. Quand la gencive est saine
 - b. Quand le patient est allergique aux anesthésiques
 - c. Quand la dent est déjà sortie
 - d. Quand la dent est enfouie dans l'os
4. Quel est le rôle principal de l'éponge hémostatique pendant l'intervention ?
 - a. Aider à contrôler le saignement dans la zone opérée
 - b. Nettoyer la bouche du patient
 - c. Remplacer la dent retirée
 - d. Anesthésier la zone

1-c 2-c 3-d 4-a

2. Lesen Sie den Dialog und beantworten Sie die Fragen.

Extraction dentaire et saignement chez un patient sous anticoagulants

Zahnextraktion und Blutung bei einem Patienten unter Antikoagulationen

Patient: Docteur, je prends des anticoagulants. Est-ce que je vais beaucoup saigner ? *(Doktor, ich nehme Blutverdünner. Werde ich stark bluten?)*

- Dentiste:** Ne vous inquiétez pas, nous prendrons toutes les précautions nécessaires pour avoir une bonne hémostase. *(Machen Sie sich keine Sorgen, wir treffen alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen, damit eine gute Hämostase erreicht wird.)*
- Patient:** Quel type d'anesthésie allez-vous utiliser ? *(Welche Art von Anästhesie werden Sie verwenden?)*
- Dentiste:** Nous utiliserons une anesthésie locale à base d'articaine. Cela va aussi aider à réduire le saignement dans la zone chirurgicale. *(Wir verwenden eine lokale Anästhesie auf Articain Basis. Das hilft auch, die Blutung im Operationsgebiet zu verringern.)*
- Patient:** Et comment allez-vous contrôler le saignement ? *(Und wie kontrollieren Sie die Blutung?)*
- Dentiste:** Nous placerons une éponge hémostatique dans l'alvéole et nous ferons quelques points de suture pour assurer une bonne coagulation. *(Wir legen einen hämostatischen Schwamm in die Alveole und setzen einige Nähte, um eine gute Blutgerinnung zu gewährleisten.)*
- Patient:** Et après l'intervention ? *(Und nach dem Eingriff?)*
- Dentiste:** Je mettrai une compresse que vous devrez mordre pendant trente minutes. *(Ich lege eine Kompresse an, die Sie dreißig Minuten fest aufbeißen müssen.)*
- Patient:** Que dois-je faire si je saigne encore ? *(Was soll ich tun, wenn ich noch blute?)*
- Dentiste:** Vous remettez une autre compresse et vous mordez encore pendant trente minutes. Si le saignement persiste, vous revenez à la clinique. *(Legen Sie eine weitere Kompresse an und beißen Sie erneut dreißig Minuten. Wenn die Blutung anhält, kommen Sie bitte wieder in die Klinik.)*
- Patient:** Merci beaucoup, docteur. *(Vielen Dank, Doktor.)*
- Dentiste:** Je pourrai aussi placer une compresse avec de l'Amchafibrine pour arrêter le saignement. Ne vous inquiétez pas. *(Ich könnte auch eine mit Amchafibrin getränkte Kompresse einlegen, um die Blutung zu stoppen. Machen Sie sich keine Sorgen.)*

1. Que prend le patient comme médicament ?

- a. Il prend des antibiotiques.
- b. Il prend des anticoagulants.
- c. Il prend des somnifères.
- d. Il prend des antalgiques.

2. Quel type d'anesthésie la dentiste va-t-elle utiliser ?

- a. Une anesthésie locale à base d'articaine.
- b. Une anesthésie générale à l'hôpital.
- c. Aucune anesthésie, seulement une compresse froide.
- d. Une sédation intraveineuse profonde.

1-b 2-a