

Zahnmedizin 9 Extractions et instructions postopératoires



- Indications et procédure des extractions (y compris les troisièmes molaires)
- Donner des instructions après l'extraction pour prévenir les complications.

Les compresses stériles (<i>sterile Kompressen</i>)	L'avulsion (<i>Zahnextraktion</i>)
Les ciseaux (<i>Scheren</i>)	Les daviers dentaires (<i>dentale Hebel (Daviers)</i>)
La curette alvéolaire (<i>alveoläre Kürette</i>)	L'élévateur (<i>Elevator (Zahnheber)</i>)
La fraise chirurgicale (<i>chirurgischer Bohrer</i>)	Porte-aiguille (<i>Nadelhalter</i>)
La troisième molaire (<i>dritter Weisheitszahn</i>)	Le porte-lame bistouri (<i>Skalpellgriff</i>)
Lambeau (<i>Lappen</i>)	Le fil de suture (<i>Nahtfaden</i>)
L'éponge hémostatique (<i>hämostatischer Schwamm</i>)	Les consignes post-op (<i>postoperative Anweisungen</i>)

1. Scannen Sie den QR-Code, um das Video anzusehen, oder lesen Sie den Text. (QR: Audio)



1. Pourquoi le dentiste anesthésie-t-il la zone avant l'extraction ?
 - a. Pour éviter toute infection
 - b. Pour rendre la dent plus blanche
 - c. Pour que l'intervention soit indolore pour le patient
 - d. Pour empêcher le patient de parler pendant l'opération
2. Que fait le chirurgien après l'incision de la gencive ?
 - a. Il pose immédiatement un fil résorbable
 - b. Il soulève un petit volet gingival
 - c. Il donne un anesthésique oral au patient
 - d. Il retire la dent sans autre manipulation

1-c 2-b

2.Übungen

1. Ordne die Elemente mit verwandter Bedeutung zu.

- | | |
|----------------------------|--|
| a. les consignes post-op | 1. la dent de sagesse |
| b. l'avulsion | 2. les instructions après l'extraction |
| c. la troisième molaire | 3. des compresses propres |
| d. les compresses stériles | 4. l'extraction d'une dent |

a-2 b-4 c-1 d-3



2. Zahnarztpraxis – Extraktion: Anweisungen nach dem Eingriff (QR: Audio)



Fülle die Lücken aus: éponge hémostatique, troisième molaire, lambeau, daviers dentaires, élévateur, cabinet, avulsion, compresse stérile

Au cabinet, une extraction ((1) _____) est proposée quand une dent est très abîmée, infectée ou quand une (2) _____ n'a pas assez de place. Pendant l'intervention, la zone est anesthésiée. Le praticien peut soulever un petit (3) _____ de gencive et utiliser un (4) _____ et des (5) _____ pour retirer la dent. La zone est ensuite rincée et une (6) _____ peut être placée si nécessaire.

Après l'extraction, mordez une (7) _____ pendant 30 minutes. Ne rincez pas la bouche et ne crachez pas pendant 24 heures pour éviter un saignement. Évitez l'alcool, le tabac et les boissons chaudes. Mangez tiède et des aliments mous du côté opposé. Si le saignement continue malgré une nouvelle compresse, ou si la douleur augmente après deux jours, contactez le (8) _____ .

In der Praxis wird eine Extraktion (Zahnextraktion) empfohlen, wenn ein Zahn stark beschädigt, infiziert ist oder wenn ein Weisheitszahn nicht genug Platz hat. Während des Eingriffs ist die Stelle betäubt. Der Behandler kann einen kleinen Zahnfleischlappen anheben und einen Heber sowie Zahnzangen verwenden, um den Zahn zu entfernen. Die Wunde wird anschließend gespült und bei Bedarf kann ein blutstillender Schwamm eingelegt werden.

Nach der Extraktion beißen Sie 30 Minuten lang auf eine sterile Kompresse. Spülen Sie den Mund nicht und spucken Sie nicht für 24 Stunden, um Nachblutungen zu vermeiden. Vermeiden Sie Alkohol, Tabak und heiße Getränke. Essen Sie lauwarmer, weiche Speisen auf der gegenüberliegenden Seite. Wenn die Blutung trotz einer neuen Kompresse anhält oder wenn die Schmerzen nach zwei Tagen zunehmen, kontaktieren Sie die Praxis.

(1) avulsion, (2) troisième molaire, (3) lambeau, (4) élévateur, (5) daviers dentaires, (6) éponge hémostatique, (7) compresse stérile, (8) cabinet

1. Dans quels cas le cabinet propose-t-il une extraction ? Donnez deux raisons.

2. Quelles sont les consignes à suivre après l'extraction pour éviter des complications et quand faut-il recontacter le cabinet ?

3. Hören Sie sich den Audioausschnitt an und wählen Sie die richtige Antwort aus. (QR: Audio)

1. La dentiste demande au patient de garder une compresse serrée entre les dents pendant une demi-heure.
2. Le patient doit se rincer la bouche tout de suite après l'extraction pour nettoyer la plaie.
3. S'il y a une fièvre ou une douleur importante, le patient doit contacter le cabinet.

Wahr Falsch

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



1-V 2-X 3-V

4. Wählen Sie die richtige Lösung

1. Avant l'avulsion de la troisième molaire, vous _____ la procédure au patient. *(Vor der Entfernung des dritten Backenzahns erklären Sie dem Patienten die Vorgehensweise.)*
a. expliquons b. expliquez c. expliqués d. expliquait
2. Après l'extraction, vous _____ une compresse stérile sur la plaie et le patient la mord. *(Nach der Extraktion legen Sie eine sterile Kompresse auf die Wunde, und der Patient beißt darauf.)*
a. mettent b. mettez c. mets d. mettiez
3. Si le patient saigne encore, vous lui _____ de garder la compresse stérile pendant 30 minutes. *(Wenn der Patient noch blutet, bitten Sie ihn, die sterile Kompresse 30 Minuten lang zu behalten.)*
a. demandez lui b. demandez c. demande d. demandiez

1. expliquez 2. mettez 3. demandez

5. Rollenspiel - Dialoge (QR: Audio)



Extraction troisième molaire

- Dr Martin (chirurgien dentiste):** *Sophie, on va faire l'avulsion de la troisième molaire en bas à droite : prépare les daviers dentaires et l'élévateur, s'il te plaît.*
(Sophie, wir werden den unteren rechten dritten Molar entfernen: Bereite bitte die Zangen und den Hebel vor.)
- Sophie (assistante dentaire):** *D'accord docteur, je mets aussi des compresses stériles et une éponge hémostatique sur la tablette.*
(In Ordnung, Doktor. Ich lege auch sterile Kompressen und einen blutstillenden Schwamm auf die Ablage.)
- Dr Martin (chirurgien dentiste):** *Très bien, je vais réaliser un petit lambeau : passe moi le porte lame bistouri et la fraise chirurgicale.*
(Sehr gut. Ich werde einen kleinen Lappen anlegen: reich mir bitte den Skalpellgriff mit der Klinge und die chirurgische Fräse.)

Sophie
(assistante
dentaire):

C'est prêt, et je tiens le fil de suture avec le porte-aiguille à côté au cas où.
(Alles bereit, und ich halte das Nahtmaterial mit der Nadelhalter links daneben, für den Fall.)

1. Quels instruments le Dr Martin demande-t-il à Sophie ?

6. Sprechen: übersetzen und antworten (QR: KI+)

Avant l'avulsion, je vérifie si vous avez... / Après l'extraction, il faut... / Si ça saigne, mordez sur une compresse stérile.



1. Vous préparez l'avulsion d'une troisième molaire : quelles questions simples posez-vous au patient avant de commencer ?

2. Après une extraction, quelles consignes post-opératoires importantes donnez-vous pour éviter un saignement ou une douleur ?

7. Schreiben: Berufliche E-Mail (QR: KI+)

Bonjour,

C'est Mme Martin. On m'a fait l'**avulsion** d'une **troisième molaire** hier à 16h. J'ai bien mordu la **compresse** pendant 30 minutes, mais ce matin je vois encore un peu de sang. J'ai aussi un gonflement et j'ai peur d'infecter la plaie.

Que dois-je faire à la maison ? Est-ce normal ?

Merci,

Mme Martin



Schreibe eine passende Antwort: *Merci pour votre message. Après l'extraction, il est normal que... / Si vous saignez encore, vous pouvez... / Si le saignement augmente ou si vous avez de la fièvre, appelez-nous au...*
