

# Zahnmedizin 9.1 Preoperatieve vragen en postoperatieve instructies

Präoperative Fragen und postoperative Anweisungen



1. Wat is het doel van de afspraak bij de specialist?
  - a. Een beugel laten plaatsen
  - b. Een controle van het gebit
  - c. Een verstandskies laten verwijderen
  - d. Een gaatje vullen in een kies
2. Welke verdoving wordt gebruikt tijdens de behandeling?
  - a. Algehele narcose in het ziekenhuis
  - b. Een pijnstillertje in tabletvorm
  - c. Een verdovende zalf op het tandvlees
  - d. Plaatselijke verdoving met een paar prikjes

1-c-2-d

## 2. Lesen Sie den Dialog und beantworten Sie die Fragen.

### Extractie en bloedverdunners

Zahnextraktion und Blutverdünner

- Patiënt:** Dokter, ik gebruik bloedverdunners. Ga ik dan veel bloeden? *(Doktor, ich nehme Blutverdünner. Werde ich dann stark bluten?)*
- Tandarts:** Maak u zich geen zorgen; we nemen alle voorzorgsmaatregelen om het bloeden goed te stoppen. *(Machen Sie sich keine Sorgen. Wir treffen alle Vorsichtsmaßnahmen, damit die Blutung gut gestillt wird.)*
- Patiënt:** Welke verdoving gaat u gebruiken? *(Welche Betäubung werden Sie verwenden?)*
- Tandarts:** We geven een lokale verdoving met articaïne. Dat helpt ook om het gebied minder te laten bloeden. *(Wir geben eine lokale Betäubung mit Articain. Das hilft auch, die Blutung im Bereich zu verringern.)*
- Patiënt:** En hoe gaat u het bloeden tijdens de extractie stoppen? *(Und wie stoppen Sie die Blutung während der Extraktion?)*
- Tandarts:** We plaatsen een speciaal hemostatisch sponsje in de holte en we zetten een paar hechtingen om alles goed te sluiten. *(Wir legen einen speziellen hämostatischen Schwamm in die Alveole und setzen ein paar Nähte, um alles gut zu verschließen.)*
- Patiënt:** En wat gebeurt er na de ingreep? *(Und was passiert nach dem Eingriff?)*
- Tandarts:** Ik leg een steriel gaasje op de wond. U moet daar dertig minuten stevig op bijten. *(Ich lege eine sterile Kompresse auf die Wunde. Sie müssen dreißig Minuten fest darauf beißen.)*
- Patiënt:** Wat moet ik doen als het toch blijft bloeden? *(Was soll ich tun, wenn es trotzdem weiter blutet?)*
- Tandarts:** Plaats dan een nieuw steriel gaasje en bijt weer dertig minuten. Als het dan nog niet stopt, komt u terug naar de kliniek. *(Dann legen Sie eine neue sterile Kompresse ein und beißen wieder dreißig Minuten. Wenn es danach noch nicht stoppt, kommen Sie in die Klinik zurück.)*
- Patiënt:** Heel erg bedankt, dokter. *(Vielen Dank, Doktor.)*

**Tandarts:** Graag gedaan. We plaatsen ook een compres met een product dat Amchafibrine heet om het bloeden extra te stoppen. Maak u geen zorgen.

*(Gern geschehen. Außerdem legen wir einen Verband mit einem Produkt namens Amchafibrine an, um die Blutung zusätzlich zu stillen. Machen Sie sich keine Sorgen.)*

1. Waar is de patiënt bang voor? *(Wovor hat der Patient Angst?)*
  - a. Voor pijn door de verdoving met articaïne
  - b. Voor schade door de chirurgische boor aan de verstandskies
  - c. Voor een infectie door de alveolaire curette
  - d. Voor veel bloeding tijdens de extractie
2. Welke verdoving gebruikt de tandarts? *(Welche Betäubung verwendet der Zahnarzt?)*
  - a. Een verdoving gecombineerd met een steriel gaasje
  - b. Geen verdoving, alleen een hemostatisch sponsje
  - c. Een lokale verdoving met articaïne
  - d. Een algehele narcose met een lipspreider

**1-d 2-c**