

Zahnmedizin 13 Spoedgevallen tandartspraktijk



- Veelvoorkomende tandheelkundige noodgevallen
- Simuleer een klinische noodsituatie met een nauwkeurige diagnose en behandelstappen

Het abces	<i>(Der Abszess)</i>	De tandgevoeligheid	<i>(Die Zahnempfindlichkeit)</i>
De pusfistel	<i>(Die Eiterfistel)</i>	De nabloeding na extractie	<i>(Die Nachblutung nach Extraktion)</i>
De aften	<i>(Die Aphthen)</i>	Wond door de prothese	<i>(Wunde durch die Prothese)</i>
De tandvlesbloeding	<i>(Die Zahnfleischblutung)</i>	De gebroken prothese	<i>(Die gebrochene Prothese)</i>
De slechte adem	<i>(Der Mundgeruch)</i>	De loszittende kroon	<i>(Die lose Krone)</i>
Pijn door een cariës	<i>(Schmerzen durch Karies)</i>	De te hoge vulling	<i>(Die zu hohe Füllung)</i>
De gebroken tand	<i>(Der gebrochene Zahn)</i>	Bijtwond bij een kind	<i>(Bisswunde bei einem Kind)</i>
De tandmobiliteit	<i>(Die Zahnbeweglichkeit)</i>		

1. Scannen Sie den QR-Code, um das Video anzusehen, oder lesen Sie den Text. (QR: Audio)



1. Waardoor krijgen veel volwassenen last van gevoelige tanden?
 - a. Door alleen 's avonds water te drinken
 - b. Door te weinig tandenpoetsen en nooit floss te gebruiken
 - c. Door teruggetrokken tandvles, te hard poetsen of bepaalde eetgewoontes
 - d. Door elke dag een mondspoeling met alcohol te gebruiken
2. Wat gebeurt er als het dentine bloot komt te liggen?
 - a. Het tandvles groeit vanzelf weer over de tand
 - b. De tand wordt vanzelf harder en sterker
 - c. Er ontstaat geen scherpe pijn meer
 - d. Prikfels kunnen via de dentinetubuli de zenuw bereiken

1-c 2-d

2.Übungen

1. Ordne die Elemente mit verwandter Bedeutung zu.

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| a. het abces | 1. bloedend tandvlees |
| b. de slechte adem | 2. een tand die kapot is |
| c. de tandvleesbloeding | 3. een holte met pus |
| d. de gebroken tand | 4. een vieze adem |



a-3 b-4 c-1 d-2

2. Notfall beim Zahnarzt (Praxismitteilung) (QR: Audio)



Fülle die Lücken aus: gebroken, pusfistel, tandvleesbloeding, cariës, nabloeding, loszittende, abces, bijtwond

Tandartspraktijk Centrum – Spoedhulp

Bel ons bij hevige pijn of bij zwelling. Als het mogelijk is, geven we dezelfde dag een spoedafspraak. Vaak gaat het om pijn door (1) _____, een (2) _____ tand of een (3) _____ kroon. Bij zwelling met een vieze smaak kan er een (4) _____ zijn; soms is er een (5) _____ in het tandvlees. Na een extractie kan een (6) _____ optreden. Bij een (7) _____ bij een kind of bij een (8) _____ die niet stopt: neem direct contact op.

Wat kunt u thuis doen? Spoel voorzichtig met lauw water en poets zacht. Vermijd warmte op de pijnlijke plek. Bij gevoelige tanden kan te hard poetsen de klachten verergeren. Neem bij pijn zo nodig paracetamol volgens de bijsluiter. Bel 112 bij benauwdheid, snel toenemende zwelling of koorts.

Zahnarztpraxis Zentrum – Notfallhilfe

Rufen Sie uns bei starken Schmerzen oder bei Schwellungen an. Wenn möglich, geben wir noch am selben Tag einen Notfalltermin. Häufig handelt es sich um Schmerzen durch Karies, einen abgebrochenen Zahn oder eine locker sitzende Krone. Bei Schwellungen mit schlechtem Geschmack kann ein Abszess vorliegen; manchmal bildet sich eine Eiterfistel im Zahnfleisch. Nach einer Extraktion kann es zu Nachblutungen kommen. Bei einer Bisswunde bei einem Kind oder bei einer Zahnfleischblutung, die nicht stoppt: nehmen Sie bitte sofort Kontakt auf.


Was können Sie zu Hause tun? Spülen Sie vorsichtig mit lauwarmem Wasser und putzen Sie sanft. Vermeiden Sie Wärme auf der schmerzenden Stelle. Bei empfindlichen Zähnen kann zu kräftiges Putzen die Beschwerden verschlimmern. Nehmen Sie bei Schmerzen gegebenenfalls Paracetamol gemäß der Packungsbeilage. Rufen Sie 112 bei Atemnot, schnell zunehmender Schwellung oder Fieber an.

(1) cariës, (2) gebroken, (3) loszittende, (4) abces, (5) pusfistel, (6) nabloeding, (7) bijtwond, (8) tandvleesbloeding

1. Welke drie voorbeelden van oorzaken voor hevige tandpijn noemt de praktijk?

2. Welke twee dingen raadt de tekst aan om thuis te doen bij tandpijn of zwelling?

3. Hören Sie sich den Audioausschnitt an und wählen Sie die richtige Antwort aus. (QR: Audio)

- | | Wahr | Falsch | |
|--|--------------------------|--------------------------|--|
| 1. De patiënt heeft kiespijn door een cariës en zijn tandvlees bloedt tijdens het poetsen. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 2. De patiënt ziet pus bij de pijnlijke plek, dus er is een pusfistel. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 3. De spoedafpraak is vandaag om twee uur 's middags gepland. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
- 1-V 2-X 3-V

4. Wählen Sie die richtige Lösung

- De patiënt _____ omdat hij plotseling veel pijn door cariës heeft. *(Der Patient ruft an, weil er plötzlich starke Schmerzen durch Karies hat.)*
 a. belde b. bellen c. belt d. bel
- Ik _____ meteen of het tandvlees nog bloedt na de extractie. *(Ich schaue sofort nach, ob das Zahnfleisch nach der Exaktion noch blutet.)*
 a. kijkt b. kijk c. keek d. kijken
- De assistent _____ of de patiënt last heeft van slechte adem en een absces. *(Die Assistentin fragt, ob der Patient unter Mundgeruch und einem Abszess leidet.)*
 a. vraagt b. vroeg c. vraag d. vragen

1. belt 2. kijkt 3. vraagt

5. Rollenspiel - Dialoge (QR: Audio)

Nabloeding na tand trekken

Patiënt: *Hallo, ik ben net thuis na het trekken van een kies en ik heb nog steeds een nabloeding. Is dat normaal?*

(Hallo, ich bin gerade nach dem Ziehen eines Zahns nach Hause gekommen und habe immer noch eine Nachblutung. Ist das normal?)

Tandartsassistente: *Een beetje bloed is normaal, maar bij aanhoudende bloedingen: bijt 30 minuten stevig op een gaasje en spoel niet met water.*

(Ein bisschen Blut ist normal, aber bei anhaltenden Blutungen: beißen Sie 30 Minuten fest auf eine Gazekompressen und spülen Sie nicht mit Wasser.)

Patiënt: *Ik gebruik bloedverduunners en ik proef steeds bloed in mijn mond. Ik maak me zorgen.*

(Ich nehme Blutverdünner und schmecke immer wieder Blut in meinem Mund. Ich mache mir Sorgen.)

Tandartsassistente: *Als het na die 30 minuten nog bloedt, willen we u vandaag nog zien op de spoedpost; neem uw medicijnlijst mee.*

(Wenn es nach diesen 30 Minuten noch blutet, möchten wir Sie heute noch in der Notfallsprechstunde sehen; bringen Sie Ihre Medikamentenliste mit.)

1. Waarom belt de patiënt de tandartspraktijk?

6. Spreken: übersetzen und antworten (QR: KI+)



*Kunt u mij vertellen sinds wanneer u last heeft? / Ik denk dat het gaat om ..., daarom adviseer ik ...
/ Als u hevige pijn of koorts heeft, neem dan direct contact op voor een spoedafspraken.*

1. Een patiënt belt voor een spoedafpraak omdat hij erge pijn heeft door cariës. Welke twee vragen stelt u en welk advies geeft u tot de afspraak?

2. Tijdens de controle ziet u een tandvleesbloeding en de patiënt zegt dat hij ook last heeft van een slechte adem. Wat zegt u tegen de patiënt en wat is de volgende stap?

7. Schreiben: E-mail (intern, Zahnarztpraxis) (QR: KI+)

Onderwerp: Spoedpatiënt vanmiddag

Hoi,

Ik had zojuist een man aan de telefoon met **hevige pijn door cariës** linksboven. Hij zegt dat de kies sinds de vulling van vorige week "hoog" aanvoelt en dat hij ook **tandvleesbloeding** heeft bij het poetsen. Geen koorts, wel gevoelig voor koud. Kun jij hem om 16:30 zien? Wat wil je dat ik alvast aan hem doorgeef?

Groet,

Lisa (balie)



Schreibe eine passende Antwort: *Kun je mij nog zeggen of de pijn constant is of alleen bij koud/warm? / Wil je dat ik tegen de patiënt zeg dat hij niet op die kant moet kauwen? / Ik kan hem om 16:30 inplannen, is dat oké?*
