

## A1.30.1 Consejos farmacéuticos

Pharmazeutische Tipps

<https://app.colanguage.com/de/spanisch/dialoge/consejo-farmaceutico>



### 1. Sehen Sie sich das Video an und beantworten Sie die zugehörigen Fragen.

Video: <https://www.youtube.be/cyRYsEaAyQQ>

**La fiebre** (Fieber)

**El virus** (Virus)

**Tratar** (behandeln)

**El remedio** (Heilmittel)

**El tratamiento** (Behandlung)

**El agua** (Wasser)

**El farmacéutico** (Apotheker)

1. ¿Qué es la fiebre?
  - a. Una reacción normal del cuerpo
  - b. Un tipo de vitamina
  - c. Una medicina para el dolor
  - d. Un deporte muy popular
2. ¿Qué puede provocar la fiebre?
  - a. El agua fría
  - b. Un virus o una bacteria
  - c. La comida picante
  - d. El ejercicio en el gimnasio
3. ¿Para qué sirven el paracetamol y el ibuprofeno?
  - a. Ayudan a tener más hambre
  - b. Ayudan a bajar la fiebre
  - c. Ayudan a dormir mejor
  - d. Ayudan a hacer más ejercicio
4. ¿Qué recomendación es apropiada cuando alguien tiene fiebre?
  - a. Beber más agua y evitar ropa ajustada
  - b. Tomar menos agua durante el día
  - c. Correr una hora en el parque
  - d. Ponerse mucha ropa muy caliente

1-a 2-b 3-b 4-a

### 2. Lesen Sie den Dialog und beantworten Sie die Fragen.

En la farmacia con fiebre

In der Apotheke mit Fieber

- Juan:** Buenos días. No me encuentro bien. Tengo fiebre desde ayer. (Guten Morgen. Mir geht es nicht gut. Ich habe seit gestern Fieber.)
- Farmacéutica:** Buenos días. ¿Tiene también dolor de cabeza o malestar? (Guten Morgen. Haben Sie auch Kopfschmerzen oder allgemeines Unwohlsein?)
- Juan:** Sí, tengo dolor de cabeza y estoy muy cansado. (Ja, ich habe Kopfschmerzen und bin sehr müde.)
- Farmacéutica:** De acuerdo. Para la fiebre puede tomar paracetamol o ibuprofeno. Los dos son antipiréticos. (In Ordnung. Gegen das Fieber können Sie Paracetamol oder Ibuprofen nehmen. Beides sind fiebersenkende Mittel.)
- Juan:** Vale. ¿Cada cuántas horas? (Gut. Alle wie viele Stunden?)

<b>Farmacéutica:</b>	El paracetamol, cada ocho horas. El ibuprofeno, cada seis horas, siempre con comida.	<i>(Paracetamol alle acht Stunden. Ibuprofen alle sechs Stunden, am besten immer zu den Mahlzeiten.)</i>
<b>Juan:</b>	Perfecto. ¿Algo más para sentirme mejor?	<i>(Perfekt. Noch etwas, damit ich mich besser fühle?)</i>
<b>Farmacéutica:</b>	Beba mucha agua y puede humedecerse la frente con agua a temperatura ambiente. Eso ayuda a bajar la temperatura.	<i>(Trinken Sie viel Wasser und befeuchten Sie die Stirn mit Wasser bei Zimmertemperatur. Das hilft, die Temperatur zu senken.)</i>
<b>Juan:</b>	De acuerdo, muchas gracias. Me voy a casa a descansar.	<i>(In Ordnung, vielen Dank. Ich gehe nach Hause, um mich auszuruhen.)</i>
<b>Farmacéutica:</b>	Muy bien. Y si la fiebre sigue más de cuarenta y ocho horas, vaya al médico. Que se mejore pronto.	<i>(Sehr gut. Und wenn das Fieber länger als achtundvierzig Stunden anhält, gehen Sie bitte zum Arzt. Gute Besserung.)</i>

1. ¿Dónde está Juan?
  - a. En el trabajo
  - b. En la farmacia
  - c. En el hospital
  - d. En casa de un amigo
2. ¿Desde cuándo tiene fiebre Juan?
  - a. Desde anoche
  - b. Desde hace un mes
  - c. Desde ayer
  - d. Desde la semana pasada

**1-b 2-c**