

B1.22.1 Hoe moet je reanimeren?

Hoe moet je reanimeren?



Bij een **bewusteloos** persoon controleer je eerst of de situatie veilig is. Daarna kijk je kort of iemand reageert en of hij nog **ademt**. Als dat niet zo is, bel je direct **de ambulance** via één honderd twaalf en zet je de telefoon op speaker. Start met **reanimatie** en laat iemand een AED halen. Volg daarna *alle* stappen en de **instructies** van het apparaat tot de hulpdiensten er zijn.

*With an **unconscious** person, you first check whether the situation is safe. Then you briefly check whether someone responds and whether he is still **breathing**. If not, you immediately call **the ambulance** via one hundred twelve and put the phone on speaker. Start **CPR** and have someone get an AED. Then follow all the steps and the **instructions** of the device until the emergency services arrive.* /p>

1. Wat moet je eerst doen voordat je het slachtoffer aanraakt?
 - a. Kijken of het veilig is om te benaderen
 - b. De borstkas dertig keer indrukken
 - c. Een AED aansluiten
 - d. Direct twee keer beademen
2. Wat doe je als het slachtoffer niet ademt?
 - a. Je legt het slachtoffer rechtop om beter te laten ademen
 - b. Je gaat naast hem zitten en start met borstcompressies
 - c. Je wacht tot de ambulance er is zonder iets te doen
 - d. Je geeft hem meteen water zodat hij bijkomt

1-a 2-b

2. Your partner suddenly becomes dizzy at home and almost faints.

Task: Schrijf wanneer je 112 belt, wanneer je de huisartsen-spoedpost belt en wat je doet als je twijfelt of je snel een arts nodig hebt.

URL: Spoed

Use in your answer: noodgeval / levensgevaar / bel 112 / huisartsen-spoedpost / op werkdagen overdag / bij twijfel