

Dentistry 13 Spoedgevallen tandartspraktijk



- Veelvoorkomende tandheelkundige noodgevallen
- Simuleer een klinische noodsituatie met een nauwkeurige diagnose en behandelstappen

Het abces	<i>(The abscess)</i>	De nabloeding na extractie	<i>(Post-extraction bleeding)</i>
De aften	<i>(Aphthous ulcers (canker sores))</i>	De slechte adem	<i>(Bad breath (halitosis))</i>
De pusfistel	<i>(The pus fistula)</i>	Wond door de prothese	<i>(Sore from the denture)</i>
Pijn door een cariës	<i>(Pain from tooth decay)</i>	De gebroken prothese	<i>(The broken denture)</i>
De gebroken tand	<i>(The broken tooth)</i>	De loszittende kroon	<i>(The loose crown)</i>
De tandmobiliteit	<i>(Tooth mobility)</i>	De te hoge vulling	<i>(The high filling)</i>
De tandgevoeligheid	<i>(Tooth sensitivity)</i>	Bijtmond bij een kind	<i>(Bite wound in a child)</i>
De tandvlesbloeding	<i>(Gum bleeding)</i>		

1. Scan the QR code to watch the video, or read the text. (QR: Audio)



1. Waardoor krijgen veel volwassenen last van gevoelige tanden?
 - a. Door teruggetrokken tandvles, te hard poetsen of bepaalde eetgewoontes
 - b. Door te weinig tandenpoetsen en nooit floss te gebruiken
 - c. Door alleen 's avonds water te drinken
 - d. Door elke dag een mondspoeling met alcohol te gebruiken
2. Wat gebeurt er als het dentine bloot komt te liggen?
 - a. Prikkelers kunnen via de dentinetubuli de zenuw bereiken
 - b. Het tandvles groeit vanzelf weer over de tand
 - c. Er ontstaat geen scherpe pijn meer
 - d. De tand wordt vanzelf harder en sterker

1-a 2-a

2. Exercises

1. Match the items that have a related meaning.

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| a. het abces | 1. bloedend tandvlees |
| b. de slechte adem | 2. een vieze adem |
| c. de tandvleesbloeding | 3. een holte met pus |
| d. de gebroken tand | 4. een tand die kapot is |



a-3 b-2 c-1 d-4

2. Emergency dental care (practice notice) (QR: Audio)



Fill in the gaps: loszittende, tandvleesbloeding, abces, nabloeding, pusfistel, gebroken, bijtewond, cariës

Tandartspraktijk Centrum – Spoedhulp

Bel ons bij hevige pijn of bij zwelling. Als het mogelijk is, geven we dezelfde dag een spoedafspraak. Vaak gaat het om pijn door (1) _____, een (2) _____ tand of een (3) _____ kroon. Bij zwelling met een vieze smaak kan er een (4) _____ zijn; soms is er een (5) _____ in het tandvlees. Na een extractie kan een (6) _____ optreden. Bij een (7) _____ bij een kind of bij een (8) _____ die niet stopt: neem direct contact op.

Wat kunt u thuis doen? Spoel voorzichtig met lauw water en poets zacht. Vermijd warmte op de pijnlijke plek. Bij gevoelige tanden kan te hard poetsen de klachten verergeren. Neem bij pijn zo nodig paracetamol volgens de bijsluiter. Bel 112 bij benauwdheid, snel toenemende zwelling of koorts.

Dental Practice Centrum – Emergency Care

Call us for severe pain or swelling. If possible, we will arrange an emergency appointment the same day. Often the pain is caused by caries, a broken tooth, or a loose crown. Swelling accompanied by a bad taste may indicate an abscess; sometimes there is a pus fistula in the gum. After an extraction, a secondary bleed can occur. For a bite wound in a child or for gum bleeding that does not stop, contact us immediately.

What can you do at home? Rinse gently with lukewarm water and brush softly. Avoid applying heat to the painful area. For sensitive teeth, brushing too hard can make the symptoms worse. If needed, take paracetamol for pain according to the package leaflet. Call 112 for shortness of breath, rapidly increasing swelling, or fever.

(1) cariës, (2) gebroken, (3) loszittende, (4) abces, (5) pusfistel, (6) nabloeding, (7) bijtewond, (8) tandvleesbloeding

1. Welke drie voorbeelden van oorzaken voor hevige tandpijn noemt de praktijk?

2. Welke twee dingen raadt de tekst aan om thuis te doen bij tandpijn of zwelling?

3. Listen to the audio fragment and choose the correct answer. (QR: Audio)

- | | True | False |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 1. De patiënt heeft kiespijn door een cariës en zijn tandvlees bloedt tijdens het poetsen. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. De patiënt ziet pus bij de pijnlijke plek, dus er is een pusfistel. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. De spoedafpraak is vandaag om twee uur 's middags gepland. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



1-V 2-X 3-V

4. Choose the correct solution

- | | |
|---|--|
| 1. De patiënt _____ omdat hij plotseling veel pijn door cariës heeft. | <i>(The patient calls because he suddenly has a lot of pain from tooth decay.)</i> |
| a. belde b. bel c. bellen d. belt | |
| 2. Ik _____ meteen of het tandvlees nog bloedt na de extractie. | <i>(I immediately check whether the gum is still bleeding after the extraction.)</i> |
| a. kijk b. kijkt c. kijken d. keek | |
| 3. De assistent _____ of de patiënt last heeft van slechte adem en een abces. | <i>(The assistant asks whether the patient has bad breath and an abscess.)</i> |
| a. vragen b. vroeg c. vraagt d. vraag | |

1. belt 2. kijkt 3. vraagt

5. Roleplay - dialogues (QR: Audio)

Nabloeding na tand trekken

Patiënt: *Hallo, ik ben net thuis na het trekken van een kies en ik heb nog steeds een nabloeding. Is dat normaal?*

(Hello, I just got home after having a tooth removed and I'm still bleeding. Is that normal?)

Tandartsassistente: *Een beetje bloed is normaal, maar bij aanhoudende bloedingen: bijt 30 minuten stevig op een gaasje en spoel niet met water.*

(A little bleeding is normal, but if it continues: bite down firmly on a gauze pad for 30 minutes and do not rinse your mouth with water.)

Patiënt: *Ik gebruik bloedverduunners en ik proef steeds bloed in mijn mond. Ik maak me zorgen.*

(I'm on blood thinners and I keep tasting blood in my mouth. I'm worried.)

Tandartsassistente: *Als het na die 30 minuten nog bloedt, willen we u vandaag nog zien op de spoedpost; neem uw medicijnlijst mee.*

(If it's still bleeding after those 30 minutes, we want to see you today at the emergency clinic. Please bring a list of your medications.)

1. Waarom belt de patiënt de tandartspraktijk?
-



6. Speaking: translate and respond (QR: AI+)

*Kunt u mij vertellen sinds wanneer u last heeft? / Ik denk dat het gaat om ..., daarom adviseer ik ...
/ Als u hevige pijn of koorts heeft, neem dan direct contact op voor een spoedafpraak.*



1. Een patiënt belt voor een spoedafpraak omdat hij erge pijn heeft door cariës. Welke twee vragen stelt u en welk advies geeft u tot de afspraak?

2. Tijdens de controle ziet u een tandvleesbloeding en de patiënt zegt dat hij ook last heeft van een slechte adem. Wat zegt u tegen de patiënt en wat is de volgende stap?

7. Writing: E-mail (internal, dental practice) (QR: AI+)

Onderwerp: Spoedpatiënt vanmiddag

Hoi,

Ik had zojuist een man aan de telefoon met **hevige pijn door cariës** linksboven. Hij zegt dat de kies sinds de vulling van vorige week "hoog" aanvoelt en dat hij ook **tandvleesbloeding** heeft bij het poetsen. Geen koorts, wel gevoelig voor koud. Kun jij hem om 16:30 zien? Wat wil je dat ik alvast aan hem doorgeef?

Groet,

Lisa (balie)



Write an appropriate response: *Kun je mij nog zeggen of de pijn constant is of alleen bij koud/warm? / Wil je dat ik tegen de patiënt zeg dat hij niet op die kant moet kauwen? / Ik kan hem om 16:30 inplannen, is dat oké?*
