

Odontología 9.1 Questions préopératoires et instructions post-opératoires



Preguntas preoperatorias e instrucciones postoperatorias

<https://app.colanguage.com/es/frances/dialogos/questions-preoperatoires>

1. Mira el vídeo y responde a las preguntas relacionadas.

Vídeo: https://wwwyoutu.be/L7GO7Wi6l_s

Arracher une dent de sagesse	(Extraer una muela del juicio)	Un levier	(Una palanca)
Anesthésier	(Anestesiar)	Les racines	(Las raíces)
Incision de la gencive	(Incisión de la encía)	Enlever les débris osseux	(Retirar los fragmentos óseos)
La dent est enfouie dans l'os	(El diente está enterrado en el hueso)	Une éponge hémostatique	(Una gasa hemostática)
Creuser l'os pour accéder à la dent	(Excavar el hueso para acceder al diente)	Un fil résorbable	(Un hilo reabsorbible)

1. Pourquoi le dentiste anesthésie-t-il la zone avant l'extraction ?
 - a. Pour empêcher le patient de parler pendant l'opération
 - b. Pour que l'intervention soit indolore pour le patient
 - c. Pour rendre la dent plus blanche
 - d. Pour éviter toute infection
2. Que fait le chirurgien après l'incision de la gencive ?
 - a. Il pose immédiatement un fil résorbable
 - b. Il retire la dent sans autre manipulation
 - c. Il soulève un petit volet gingival
 - d. Il donne un anesthésique oral au patient
3. Dans quel cas faut-il creuser l'os pour accéder à la dent ?
 - a. Quand la dent est déjà sortie
 - b. Quand le patient est allergique aux anesthésiques
 - c. Quand la dent est enfouie dans l'os
 - d. Quand la gencive est saine
4. Quel est le rôle principal de l'éponge hémostatique pendant l'intervention ?
 - a. Nettoyer la bouche du patient
 - b. Anesthésier la zone
 - c. Aider à contrôler le saignement dans la zone opérée
 - d. Remplacer la dent retirée

1-b 2-c 3-c 4-c

2. Lee el diálogo y responde a las preguntas.

Extraction dentaire et saignement chez un patient sous anticoagulants

Extracción dental y sangrado en un paciente con anticoagulantes

Patient: Docteur, je prends des anticoagulants. Est-ce que (Doctor, tomo anticoagulantes. ¿Voy a sangrar mucho?) je vais beaucoup saigner ?

Dentiste: Ne vous inquiétez pas, nous prendrons toutes les précautions nécessaires pour avoir une bonne hémostase.	(No se preocupe, tomaremos todas las precauciones necesarias para conseguir una buena hemostasia.)
Patient: Quel type d'anesthésie allez-vous utiliser ?	(¿Qué tipo de anestesia va a usar?)
Dentiste: Nous utiliserons une anesthésie locale à base d'articaïne. Cela va aussi aider à réduire le saignement dans la zone chirurgicale.	(Usaremos anestesia local a base de articaina. Eso también ayudará a reducir el sangrado en la zona quirúrgica.)
Patient: Et comment allez-vous contrôler le saignement ?	(¿Y cómo van a controlar el sangrado?)
Dentiste: Nous placerons une éponge hémostatique dans l'alvéole et nous ferons quelques points de suture pour assurer une bonne coagulation.	(Colocaremos una esponja hemostática en el alvéolo y daremos algunos puntos de sutura para asegurar una buena coagulación.)
Patient: Et après l'intervention ?	(¿Y después de la intervención?)
Dentiste: Je mettrai une compresse que vous devrez mordre pendant trente minutes.	(Le pondré una compresa que deberá morder durante treinta minutos.)
Patient: Que dois-je faire si je saigne encore ?	(¿Qué debo hacer si todavía sangro?)
Dentiste: Vous remettez une autre compresse et vous mordez encore pendant trente minutes. Si le saignement persiste, vous revenez à la clinique.	(Vuelva a colocar otra compresa y muerda de nuevo durante treinta minutos. Si el sangrado persiste, regrese a la clínica.)
Patient: Merci beaucoup, docteur.	(Muchas gracias, doctor.)
Dentiste: Je pourrai aussi placer une compresse avec de l'Amchafibrine pour arrêter le saignement. Ne vous inquiétez pas.	(También podría poner una compresa con Amchafibrina para detener el sangrado. No se preocupe.)

1. Que prend le patient comme médicament ?
 - a. Il prend des somnifères.
 - b. Il prend des anticoagulants.
 - c. Il prend des antalgiques.
 - d. Il prend des antibiotiques.

2. Quel type d'anesthésie la dentiste va-t-elle utiliser ?
 - a. Aucune anesthésie, seulement une compresse froide.
 - b. Une sédation intraveineuse profonde.
 - c. Une anesthésie locale à base d'articaïne.
 - d. Une anesthésie générale à l'hôpital.

1-b 2-c

3. Quels sont les facteurs de risque et les mesures préventives que vous discutez avec un patient avant une extraction dentaire afin de réduire le risque de complications postopératoires ?

1. <https://www.dentaly.org/extraction-dentaire-tout-savoir-avant-de-se-faire-arracher-une-dent/>