Ouitar los restos óseos

precauciones para detener bien el sangrado.)

apretar masticando durante treinta minutos.)

cerrar bien.)

## Odontología.11 Questions préopératoires et instructions post-opératoires

Preguntas preoperatorias e instrucciones postoperatorias

★ https://app.colanguage.com/es/frances/dialogos/questions-preoperatoires

## 1. Mira el vídeo y reconoce el vocabulario.

Vídeo: https://www.youtu.be/L7GO7Wi6I s

**Arracher une dent de** Arrancar una muela del

iuicio Un levier Una palanca sagesse Las raíces Anesthésier Anestesiar Les racines

Faire une incision dans Hacer una incisión en la Enlever les débris

encía la gencive osseux La dent est enfouie El diente está enterrado L'éponge

La esponja hemostática dans l'os en el hueso hémostatique

Il faut creuser dans l'osHay que cavar en el hueso Le fil résorbable Fl hilo reabsorbible

Céder à la dent Ceder al diente

## 2. Lee el diálogo y responde a las preguntas.

Une consultation médicale où le patient pose des questions sur l'anesthésie, le contrôle du saignement et les soins post-opératoires.

Una consulta médica donde el paciente hace preguntas sobre la anestesia, el control del sangrado y los cuidados postoperatorios.

(Doctor, tomo anticoagulantes. ¿Voy a sangrar Patient: Docteur, je prends des anticoagulants. Est-ce que je vais mucho?)

beaucoup saigner?

(No se preocupe, tomaremos todas las **Dentiste:** Ne vous inquiétez pas, nous prendrons toutes les

précautions pour bien arrêter le saignement.

Patient: Quelle anesthésie allez-vous utiliser? (¿Qué anestesia van a usar?)

Dentiste: Nous ferons une anesthésie locale avec de l'articaïne. Cela (Haremos una anestesia local con articaína. Esto ayudará a que la zona sangre menos.)

aidera à moins faire saigner la zone.

Patient : Et comment allez-vous arrêter le saignement ? (¿Y cómo van a detener el sangrado?)

**Dentiste:** Nous mettrons une éponge spéciale dans la cavité et nous (Pondremos una gasa especial en la cavidad y haremos algunos puntos de sutura para

ferons quelques points de suture pour bien fermer.

Patient: Et après l'opération? (¿Y después de la operación?)

(Voy a poner una compresa que deberá **Dentiste:** Je vais mettre une compresse que vous devrez serrer en

croquant pendant trente minutes.

(¿Qué debo hacer si sigue sangrando?) **Patient:** Que dois-je faire si ça saigne encore?

(Ponga otra compresa y mastique otros **Dentiste:** Mettez une autre compresse et mâchez encore trente

treinta minutos. Si no se detiene, vuelva a la minutes. Si ça ne s'arrête pas, revenez à la clinique. clínica.)

Patient: Merci beaucoup, docteur. (Muchas gracias, doctor.)

(Colocaremos una compresa con un producto

**Dentiste:** Nous placerons une compresse avec un produit appelé llamado Amchafibrine para detener el Amchafibrine pour arrêter le saignement. Ne vous

sangrado. No se preocupe.)

inquiétez pas.

	Module	3	Minor surgery, periodontology and prosthetics
3. E	lige la respuesta correcta.		
	1. Quel est le principal souci du patient au début de la conversation ? (¿Cuál es la principal preocupación del paciente al inicio de la conversación?)		
	☐ Il demande s'il va beaucoup saigner à cause		Il s'inquiète de la durée de l'anesthésie.
	des anticoagulants.		
	☐ Il demande combien coûtera l'extraction.		Il veut savoir quel dentiste fera l'intervention.
	2. Quel type d'anesthésie le dentiste utilisera-t-il (¿Qué tipo de anestesia usará el dentista?)	?	
	□ Une anesthésie générale complète.		Une anesthésie locale à base d'articaïne.
	☐ Une anesthésie sans produit chimique.		Une anesthésie injectable à base de lidocaïne.
	3. Que demande le patient à propos de l'après-intervention ? (¿Qué pregunta el paciente sobre el postoperatorio?)		
	☐ Comment contrôler la douleur avec des médicaments.		S'il doit prendre des antibiotiques.
	☐ Comment il doit mordre la compresse et pendant combien de temps.		S'il peut conduire après l'anesthésie.
	4. Que doit faire le patient si le saignement continue après l'intervention ? (¿Qué debe hacer el paciente si el sangrado continúa después de la intervención?)		
	☐ Prendre des médicaments et ne pas revenir à	à□	Éviter de manger mais ne pas remettre de
	la clinique.	CC	ompresse.
	☐ Appeler un autre dentiste immédiatement.		Remettre une autre compresse et revenir à la
		cl	nique si cela persiste.
<b>1</b> . II a	lemande s'il va beaucoup saigner à cause des anticoagulants./Pregunta si va a sang Una anestesia local a base de articaina. 3. Comment il doit mordre la compresse ei Remettre une autre compresse et revenir à la clinic	t pen	
4. F	Responde a las preguntas y corrígelas con tu	ı pı	rofesor.
	Pourquoi le dentiste choisit-il une anesthésie loc (¿Por qué el dentista elige una anestesia local a base de articaina para la extracci	ale	
2.	Quelles mesures le dentiste prend-il pour arrête (¿Qué medidas toma el dentista para detener el sangrado durante y después de la		
3.	Que doit faire le patient si le saignement continu (¿Qué debe hacer el paciente si el sangrado continúa después de morder la gasa?		près avoir mordu la compresse ?
4.	Quels conseils supplémentaires donneriez-vo alvéolite après une extraction ? ¿Qué consejos adicionales daría para evitar complicaciones como una alveolitis d		