

Odontología 9.1 Questions préopératoires et instructions post-opératoires

Preguntas preoperatorias e instrucciones postoperatorias



1. Pourquoi le dentiste anesthésie-t-il la zone avant l'extraction ?
 - a. Pour rendre la dent plus blanche
 - b. Pour empêcher le patient de parler pendant l'opération
 - c. Pour éviter toute infection
 - d. Pour que l'intervention soit indolore pour le patient
2. Que fait le chirurgien après l'incision de la gencive ?
 - a. Il pose immédiatement un fil résorbable
 - b. Il retire la dent sans autre manipulation
 - c. Il soulève un petit volet gingival
 - d. Il donne un anesthésique oral au patient

1-d 2-c

2. Lee el diálogo y responde a las preguntas.

Extraction dentaire et saignement chez un patient sous anticoagulants

Extracción dental y sangrado en un paciente con anticoagulantes

- Patient:** Docteur, je prends des anticoagulants. Est-ce que je vais beaucoup saigner ? *(Doctor, tomo anticoagulantes. ¿Voy a sangrar mucho?)*
- Dentiste:** Ne vous inquiétez pas, nous prendrons toutes les précautions nécessaires pour avoir une bonne hémostase. *(No se preocupe, tomaremos todas las precauciones necesarias para conseguir una buena hemostasia.)*
- Patient:** Quel type d'anesthésie allez-vous utiliser ? *(¿Qué tipo de anestesia va a usar?)*
- Dentiste:** Nous utiliserons une anesthésie locale à base d'articaine. Cela va aussi aider à réduire le saignement dans la zone chirurgicale. *(Usaremos anestesia local a base de articaina. Eso también ayudará a reducir el sangrado en la zona quirúrgica.)*
- Patient:** Et comment allez-vous contrôler le saignement ? *(¿Y cómo van a controlar el sangrado?)*
- Dentiste:** Nous placerons une éponge hémostatique dans l'alvéole et nous ferons quelques points de suture pour assurer une bonne coagulation. *(Colocaremos una esponja hemostática en el alvéolo y daremos algunos puntos de sutura para asegurar una buena coagulación.)*
- Patient:** Et après l'intervention ? *(¿Y después de la intervención?)*
- Dentiste:** Je mettrai une compresse que vous devrez mordre pendant trente minutes. *(Le pondré una compresa que deberá morder durante treinta minutos.)*
- Patient:** Que dois-je faire si je saigne encore ? *(¿Qué debo hacer si todavía sangro?)*
- Dentiste:** Vous remettez une autre compresse et vous mordez encore pendant trente minutes. Si le saignement persiste, vous revenez à la clinique. *(Vuelva a colocar otra compresa y muerda de nuevo durante treinta minutos. Si el sangrado persiste, regrese a la clínica.)*
- Patient:** Merci beaucoup, docteur. *(Muchas gracias, doctor.)*

Dentiste: Je pourrai aussi placer une compresse avec de l'Amchafibrine pour arrêter le saignement. Ne vous inquiétez pas.

(También podría poner una compresa con Amchafibrina para detener el sangrado. No se preocupe.)

1. Que prend le patient comme médicament ? *(¿Qué medicamento toma el paciente?)*
 - a. Il prend des antibiotiques.
 - b. Il prend des somnifères.
 - c. Il prend des antalgiques.
 - d. Il prend des anticoagulants.
2. Quel type d'anesthésie la dentiste va-t-elle utiliser ? *(¿Qué tipo de anestesia va a usar la dentista?)*
 - a. Une sédation intraveineuse profonde.
 - b. Aucune anesthésie, seulement une compresse froide.
 - c. Une anesthésie générale à l'hôpital.
 - d. Une anesthésie locale à base d'articaine.

1-d 2-d