

Odontología 9.1 Preoperatieve vragen en postoperatieve instructies

Preguntas preoperatorias e instrucciones postoperatorias



1. Wat is het doel van de afspraak bij de specialist?
 - a. Een gaatje vullen in een kies
 - b. Een beugel laten plaatsen
 - c. Een controle van het gebit
 - d. Een verstandskies laten verwijderen
2. Welke verdoving wordt gebruikt tijdens de behandeling?
 - a. Een pijnstiller in tabletvorm
 - b. Een verdovende zalf op het tandvlees
 - c. Plaatselijke verdoving met een paar prikjes
 - d. Algehele narcose in het ziekenhuis

1-d 2-c

2. Lee el diálogo y responde a las preguntas.

Extractie en bloedverdunners

Extracción y anticoagulantes

- Patiënt:** Dokter, ik gebruik bloedverdunners. Ga ik dan veel bloeden?
(Doctor, estoy tomando anticoagulantes. ¿Voy a sangrar mucho?)
- Tandarts:** Maak u zich geen zorgen; we nemen alle voorzorgsmaatregelen om het bloeden goed te stoppen.
(No se preocupe; tomamos todas las precauciones para controlar bien el sangrado.)
- Patiënt:** Welke verdoving gaat u gebruiken?
(¿Qué anestesia va a usar?)
- Tandarts:** We geven een lokale verdoving met articaïne. Dat helpt ook om het gebied minder te laten bloeden.
(Le pondremos anestesia local con articaína. Eso también ayuda a que la zona sangre menos.)
- Patiënt:** En hoe gaat u het bloeden tijdens de extractie stoppen?
(¿Y cómo va a detener el sangrado durante la extracción?)
- Tandarts:** We plaatsen een speciaal hemostatisch sponsje in de holte en we zetten een paar hechtingen om alles goed te sluiten.
(Colocamos una esponja hemostática especial en la cavidad y damos unos puntos para cerrar todo correctamente.)
- Patiënt:** En wat gebeurt er na de ingreep?
(¿Y qué ocurre después del procedimiento?)
- Tandarts:** Ik leg een steriel gaasje op de wond. U moet daar dertig minuten stevig op bijten.
(Le pongo una gasa estéril sobre la herida. Debe morderla con firmeza durante treinta minutos.)
- Patiënt:** Wat moet ik doen als het toch blijft bloeden?
(¿Qué debo hacer si sigue sangrando?)
- Tandarts:** Plaats dan een nieuw steriel gaasje en bijt weer dertig minuten. Als het dan nog niet stopt, komt u terug naar de kliniek.
(Coloque entonces una gasa estéril nueva y vuelva a morder durante treinta minutos. Si aun así no para, vuelva a la clínica.)
- Patiënt:** Heel erg bedankt, dokter.
(Muchas gracias, doctor.)

Tandarts: Graag gedaan. We plaatsen ook een compres met een product dat Amchafibrine heet om het bloeden extra te stoppen. Maak u geen zorgen. *(De nada. También colocamos una compresa con un producto llamado Amchafibrine para ayudar a detener el sangrado. No se preocupe.)*

1. Waar is de patiënt bang voor? *(¿Qué teme el paciente?)*
 - a. Voor een infectie door de alveolaire curette
 - b. Voor schade door de chirurgische boor aan de verstandskies
 - c. Voor pijn door de verdoving met articaïne
 - d. Voor veel bloeding tijdens de extractie
2. Welke verdoving gebruikt de tandarts? *(¿Qué anestesia usa el dentista?)*
 - a. Een verdoving gecombineerd met een steriel gaasje
 - b. Geen verdoving, alleen een hemostatisch sponsje
 - c. Een algehele narcose met een lipspreider
 - d. Een lokale verdoving met articaïne

1-d 2-d