

Dentisterie 9.1 Questions préopératoires et instructions post-opératoires



1. Regardez la vidéo et répondez aux questions associées.

Vidéo https://www.youtu.be/L7GO7Wi6l_s

Arracher une dent de sagesse

Anesthésier

Incision de la gencive

La dent est enfouie dans l'os

Creuser l'os pour accéder à la dent

Un levier

Les racines

Enlever les débris osseux

Une éponge hémostatique

Un fil résorbable

1. Pourquoi le dentiste anesthésie-t-il la zone avant l'extraction ?
 - a. Pour rendre la dent plus blanche
 - b. Pour éviter toute infection
 - c. Pour empêcher le patient de parler pendant l'opération
 - d. Pour que l'intervention soit indolore pour le patient
2. Que fait le chirurgien après l'incision de la gencive ?
 - a. Il retire la dent sans autre manipulation
 - b. Il pose immédiatement un fil résorbable
 - c. Il donne un anesthésique oral au patient
 - d. Il soulève un petit volet gingival
3. Dans quel cas faut-il creuser l'os pour accéder à la dent ?
 - a. Quand le patient est allergique aux anesthésiques
 - b. Quand la dent est déjà sortie
 - c. Quand la dent est enfouie dans l'os
 - d. Quand la gencive est saine
4. Quel est le rôle principal de l'éponge hémostatique pendant l'intervention ?
 - a. Nettoyer la bouche du patient
 - b. Aider à contrôler le saignement dans la zone opérée
 - c. Anesthésier la zone
 - d. Remplacer la dent retirée

1-d 2-d 3-c 4-b

2. Lisez le dialogue et répondez aux questions.

Patient: Docteur, je prends des anticoagulants. Est-ce que je vais beaucoup saigner ?

Dentiste: Ne vous inquiétez pas, nous prendrons toutes les précautions nécessaires pour avoir une bonne hémostase.

Patient: Quel type d'anesthésie allez-vous utiliser ?

Dentiste: Nous utiliserons une anesthésie locale à base d'articaine. Cela va aussi aider à réduire le saignement dans la zone chirurgicale.

Patient: Et comment allez-vous contrôler le saignement ?

Dentiste: Nous placerons une éponge hémostatique dans l'alvéole et nous ferons quelques points de suture pour assurer une bonne coagulation.

Patient: Et après l'intervention ?

Dentiste: Je mettrai une compresse que vous devrez mordre pendant trente minutes.

Patient: Que dois-je faire si je saigne encore ?

Dentiste: Vous remettez une autre compresse et vous mordez encore pendant trente minutes. Si le saignement persiste, vous revenez à la clinique.

Patient: Merci beaucoup, docteur.

Dentiste: Je pourrai aussi placer une compresse avec de l'Amchafibrine pour arrêter le saignement. Ne vous inquiétez pas.

1. Que prend le patient comme médicament ?

a. Il prend des anticoagulants.

b. Il prend des antalgiques.

c. Il prend des somnifères.

d. Il prend des antibiotiques.

2. Quel type d'anesthésie la dentiste va-t-elle utiliser ?

a. Aucune anesthésie, seulement une compresse froide.

b. Une sédation intraveineuse profonde.

c. Une anesthésie locale à base d'articaine.

d. Une anesthésie générale à l'hôpital.

1-a 2-c