

Dentisterie 9.1 Questions préopératoires et instructions post-opératoires



<https://app.colanguage.com/fr/francais/dialogues/questions-preoperatoires>

1. Regardez la vidéo et répondez aux questions associées.

Vidéo https://www.youtube.be/L7GO7Wi6l_s

Arracher une dent de sagesse

Un levier

Anesthésier

Les racines

Incision de la gencive

Enlever les débris osseux

La dent est enfouie dans l'os

Une éponge hémostatique

Creuser l'os pour accéder à la dent

Un fil résorbable

1. Pourquoi le dentiste anesthésie-t-il la zone avant l'extraction ?
 - a. Pour empêcher le patient de parler pendant l'opération
 - b. Pour rendre la dent plus blanche
 - c. Pour que l'intervention soit indolore pour le patient
 - d. Pour éviter toute infection
2. Que fait le chirurgien après l'incision de la gencive ?
 - a. Il pose immédiatement un fil résorbable
 - b. Il soulève un petit volet gingival
 - c. Il donne un anesthésique oral au patient
 - d. Il retire la dent sans autre manipulation
3. Dans quel cas faut-il creuser l'os pour accéder à la dent ?
 - a. Quand la gencive est saine
 - b. Quand le patient est allergique aux anesthésiques
 - c. Quand la dent est déjà sortie
 - d. Quand la dent est enfouie dans l'os
4. Quel est le rôle principal de l'éponge hémostatique pendant l'intervention ?
 - a. Remplacer la dent retirée
 - b. Aider à contrôler le saignement dans la zone opérée
 - c. Nettoyer la bouche du patient
 - d. Anesthésier la zone

1-c 2-b 3-d 4-b

2. Lisez le dialogue et répondez aux questions.

Patient: Docteur, je prends des anticoagulants. Est-ce que je vais beaucoup saigner ?

Dentiste: Ne vous inquiétez pas, nous prendrons toutes les précautions nécessaires pour avoir une bonne hémostase.

Patient: Quel type d'anesthésie allez-vous utiliser ?

Dentiste: Nous utiliserons une anesthésie locale à base d'articaïne. Cela va aussi aider à réduire le saignement dans la zone chirurgicale.

Patient: Et comment allez-vous contrôler le saignement ?

Dentiste: Nous placerons une éponge hémostatique dans l'alvéole et nous ferons quelques points de suture pour assurer une bonne coagulation.

Patient: Et après l'intervention ?

Dentiste: Je mettrai une compresse que vous devrez mordre pendant trente minutes.

Patient: Que dois-je faire si je saigne encore ?

Dentiste: Vous remettez une autre compresse et vous mordez encore pendant trente minutes. Si le saignement persiste, vous revenez à la clinique.

Patient: Merci beaucoup, docteur.

Dentiste: Je pourrai aussi placer une compresse avec de l'Amchafibrine pour arrêter le saignement. Ne vous inquiétez pas.

1. Que prend le patient comme médicament ?

- a. Il prend des somnifères.
- b. Il prend des anticoagulants.
- c. Il prend des antalgiques.
- d. Il prend des antibiotiques.

2. Quel type d'anesthésie la dentiste va-t-elle utiliser ?

- a. Aucune anesthésie, seulement une compresse
- b. Une sédation intraveineuse profonde. froide.
- c. Une anesthésie locale à base d'articaïne.
- d. Une anesthésie générale à l'hôpital.

1-b 2-c

3. Quels sont les facteurs de risque et les mesures préventives que vous discutez avec un patient avant une extraction dentaire afin de réduire le risque de complications postopératoires ?

1. <https://www.dentaly.org/extraction-dentaire-tout-savoir-avant-de-se-faire-arracher-une-dent/>