

B2.44.2 Structurer son message : mais, donc

Organisez vos idées avec des connecteurs : c'est-à-dire, cependant, parce que, donc, par conséquent.



1. Pour expliquer -> c'est-à-dire, à savoir.

2. Pour opposer -> mais, cependant, néanmoins.

3. Pour conclure -> donc, ainsi, par conséquent.

Connecteurs	Exemple
C'est-à-dire / à savoir	Il prend un sédatif, c'est-à-dire un médicament calmant.
Soit	Il suit deux traitements, soit une pommade et un sirop.
Mais / cependant	La pilule agit vite, mais elle fatigue le patient.
Néanmoins / en revanche	Le remède soulage, néanmoins la guérison reste lente.
Car / parce que	Il respecte la prescription parce qu' il veut guérir.
Etant donné que	Étant donné qu' il souffre, le médecin prescrit un comprimé.
Donc / alors	Le médicament agit, donc le patient dort mieux.
Par conséquent / ainsi	La douleur baisse; par conséquent , il continue le traitement.

1. Traduire et choisir la bonne réponse

1. Vous devez prendre ce comprimé pendant dix jours, _____ l'infection n'a pas totalement disparu.

a. donc b. parce que c. car d. c'est-à-dire
2. La pommade soulage rapidement, _____ elle irrite un peu la peau au début.

a. mais b. donc c. par conséquent d. parce que
3. Il s'agit d'un sédatif, _____ un médicament calmant qui peut provoquer de la somnolence.

a. donc b. ce que c. c'est-à-dire d. par conséquent
4. J'ai bien respecté la prescription, _____ je ne comprends pas pourquoi la guérison est si lente.

a. donc b. c'est-à-dire c. parce que d. mais

1. parce que 2. mais 3. c'est-à-dire 4. donc

2. Réécrivez les phrases (QR: IA+)



1. (c'est-à-dire) Le médecin parle d'un sédatif. C'est un médicament calmant.

2. (soit) Le traitement comprend deux produits : une pommade et un sirop.

3. (cependant) La crème réduit les démangeaisons. Elle irrite parfois la peau.

4. (néanmoins) Les analyses sont rassurantes. Le patient reste inquiet.
-

3. Corrigez l'erreur

1. Les analyses sont normales, mais on arrête le traitement.

Les analyses sont normales, donc on arrête le traitement.

2. Je prends l'antibiotique, donc je suis encore fébrile.

Je prends l'antibiotique, mais je suis encore fébrile.

- 1.** Les analyses sont normales, donc on arrête le traitement. **2.** Je prends l'antibiotique, mais je suis encore fébrile.