

Dentisterie 9.1 Preoperatieve vragen en postoperatieve instructies

Questions préopératoires et instructions postopératoires



1. Wat is het doel van de afspraak bij de specialist?
 - a. Een controle van het gebit
 - b. Een gaatje vullen in een kies
 - c. Een beugel laten plaatsen
 - d. Een verstandskies laten verwijderen
2. Welke verdoving wordt gebruikt tijdens de behandeling?
 - a. Een verdovende zalf op het tandvlees
 - b. Algehele narcose in het ziekenhuis
 - c. Plaatselijke verdoving met een paar prikjes
 - d. Een pijnstillertablet

1-d 2-c

2. Lisez le dialogue et répondez aux questions.

Extractie en bloedverdunners

Extraction et anticoagulants

- Patiënt:** Dokter, ik gebruik bloedverdunners. Ga ik dan veel bloeden? *(Docteur, je prends des anticoagulants. Est-ce que je vais beaucoup saigner ?)*
- Tandarts:** Maak u zich geen zorgen; we nemen alle voorzorgsmaatregelen om het bloeden goed te stoppen. *(Ne vous inquiétez pas ; nous prenons toutes les précautions pour bien arrêter le saignement.)*
- Patiënt:** Welke verdoving gaat u gebruiken? *(Quelle anesthésie allez-vous utiliser ?)*
- Tandarts:** We geven een lokale verdoving met articaïne. Dat helpt ook om het gebied minder te laten bloeden. *(Nous pratiquons une anesthésie locale à base d'articaine. Cela aide aussi à réduire le saignement dans la zone.)*
- Patiënt:** En hoe gaat u het bloeden tijdens de extractie stoppen? *(Et comment allez-vous arrêter le saignement pendant l'extraction ?)*
- Tandarts:** We plaatsen een speciaal hemostatisch sponsje in de holte en we zetten een paar hechtingen om alles goed te sluiten. *(Nous plaçons une compresse hémostatique spéciale dans la cavité et nous mettons quelques points de suture pour bien refermer le tout.)*
- Patiënt:** En wat gebeurt er na de ingreep? *(Et que se passe-t-il après l'intervention ?)*
- Tandarts:** Ik leg een steriel gaasje op de wond. U moet daar dertig minuten stevig op bijten. *(Je pose une compresse stérile sur la plaie. Vous devez mordre fermement dessus pendant trente minutes.)*
- Patiënt:** Wat moet ik doen als het toch blijft bloeden? *(Que dois-je faire si ça continue de saigner ?)*
- Tandarts:** Plaats dan een nieuw steriel gaasje en bijt weer dertig minuten. Als het dan nog niet stopt, komt u terug naar de kliniek. *(Mettez alors une nouvelle compresse stérile et mordez de nouveau pendant trente minutes. Si cela ne s'arrête toujours pas, revenez à la clinique.)*
- Patiënt:** Heel erg bedankt, dokter. *(Merci beaucoup, docteur.)*

Tandarts: Graag gedaan. We plaatsen ook een compress met een product dat Amchafibrine heet om het bloeden extra te stoppen. Maak u geen zorgen.

(Je vous en prie. Nous plaçons aussi un compressif contenant un produit appelé Amchafibrine pour aider à arrêter davantage le saignement. Ne vous inquiétez pas.)

1. Waar is de patiënt bang voor? *(De quoi a peur le patient ?)*
 - a. Voor pijn door de verdoving met articaïne
 - b. Voor een infectie door de alveolaire curette
 - c. Voor veel bloeding tijdens de extractie
 - d. Voor schade door de chirurgische boor aan de verstandskies
2. Welke verdoving gebruikt de tandarts? *(Quelle anesthésie utilise le dentiste ?)*
 - a. Een lokale verdoving met articaïne
 - b. Een algehele narcose met een lipspreider
 - c. Geen verdoving, alleen een hemostatisch sponsje
 - d. Een verdoving gecombineerd met een steriel gaasje

1-c 2-a