

Dentisterie 11.1 Solution for an unstable dental prosthesis

Solution pour une prothèse dentaire instable



1. Regardez la vidéo et répondez aux questions associées.

Vidéo <https://www.youtube.com/watch?v=gR34cyfSrGA&t=233s&start=60&end=165>

De eerste afdruk	<i>(La première empreinte)</i>	Anatomisch model	<i>(Modèle anatomique)</i>
Op maat gemaakte lepels	<i>(Cuillères sur mesure)</i>	Het gebit	<i>(La denture)</i>
Individuele afdrukken	<i>(Empreintes individuelles)</i>	Waswallen (occlusiewax)	<i>(Cires d'occlusion)</i>
Detailweergave van de kaak	<i>(Vue détaillée de la mâchoire)</i>		

1. Wat is het doel van deze afspraak?
 - a. Direct een nieuwe prothese plaatsen
 - b. Alle oude vullingen vervangen
 - c. Een röntgenfoto van de kaak maken
 - d. Nieuwe, nauwkeurigere afdrukken van het gebit maken
2. Waarop zijn de speciale lepels op maat gebaseerd?
 - a. Op een standaard fabrieksmaat
 - b. Op een oude prothese van de patiënt
 - c. Op de eerste afdruk die eerder is gemaakt
 - d. Op een digitale gezichtsscanner
3. Wat gebeurt er met de afdrukken nadat ze gemaakt zijn?
 - a. Ze worden direct als prothese gebruikt
 - b. Ze worden alleen in het patiëntendossier bewaard
 - c. Ze worden meteen weggegooid
 - d. Er worden anatomische modellen van gemaakt om verder op te werken
4. Wat controleert de tandarts nadat de afdrukken klaar zijn?
 - a. De stand van de tanden en kiezen en het midden van het gezicht
 - b. De kleur van het kunstgebit
 - c. Of het tandvlees rood is
 - d. Of de patiënt pijn heeft bij het kauwen

1-d 2-c 3-d 4-a

2. Lisez le dialogue et répondez aux questions.

Losse tand onder een oude partiële prothese

Dent qui bouge sous une prothèse partielle ancienne

Patiënt: Dokter, een tand die mijn prothese ondersteunt, beweegt heel erg. Wat kunt u doen?

(Docteur, une dent qui soutient ma prothèse bouge beaucoup. Que pouvez-vous faire ?)

Tandarts: Deze tand is erg beweeglijk en moet worden verwijderd om pijn en een infectie te voorkomen.

(Cette dent est très mobile et doit être retirée pour éviter la douleur et une infection.)

Patiënt: En wat als mijn prothese daarna niet meer goed blijft zitten?

(Et si ma prothèse ne tient plus bien après cela ?)

Tandarts: Uw prothese is erg oud en past niet meer goed. Het is beter om daar geen nieuwe tand op te zetten.	<i>(Votre prothèse est très ancienne et ne s'adapte plus correctement. Il vaut mieux ne pas y fixer une nouvelle dent.)</i>
Patiënt: Wat is dan de oplossing?	<i>(Quelle est alors la solution ?)</i>
Tandarts: Ik stel een nieuwe partiële kunstharsprothese voor, aangepast aan uw mond zoals die nu is.	<i>(Je propose une nouvelle prothèse partielle en résine acrylique, adaptée à votre bouche telle qu'elle est maintenant.)</i>
Patiënt: En als andere tanden ook gaan bewegen?	<i>(Et si d'autres dents commencent aussi à bouger ?)</i>
Tandarts: Als een andere tand gaat bewegen, verwijderen we die en voegen we hem zonder probleem toe aan de nieuwe prothese.	<i>(Si une autre dent devient mobile, nous l'enlèverons et l'ajouterons sans problème à la nouvelle prothèse.)</i>
Patiënt: Dat begrijp ik. Wanneer kunnen we beginnen?	<i>(Je comprends. Quand pouvons-nous commencer ?)</i>
Tandarts: Als u akkoord bent, plan ik snel afspraken in om te starten.	<i>(Si vous êtes d'accord, je planifierai rapidement des rendez vous pour commencer.)</i>

1. Waarom wil de tandarts de losse tand verwijderen?
 - a. Om ruimte te maken voor articulatiepapier
 - b. Om pijn en een infectie te voorkomen
 - c. Omdat de tandarts een metalen frame wil plaatsen
 - d. Omdat de patiënt een volledige prothese wil
2. Wat zegt de tandarts over de huidige prothese van de patiënt?
 - a. De prothese is erg oud en past niet meer goed
 - b. De prothese is een stellite met metalen haakjes
 - c. De prothese is van alginaat gemaakt
 - d. De prothese is nieuw en past goed

1-b 2-a