

B1.22.1 Hoe moet je reanimeren?

Comment faut-il réanimer ?



Bij een **bewusteloos** persoon controleer je eerst of de situatie veilig is. Daarna kijk je kort of iemand reageert en of hij nog **ademt**. Als dat niet zo is, bel je direct **de ambulance** via één honderd twaalf en zet je de telefoon op speaker. Start met **reanimatie** en laat iemand een AED halen. Volg daarna *alle* stappen en de **instructies** van het apparaat tot de hulpdiensten er zijn.



*Chez une personne **inconsciente**, tu vérifies d'abord si la situation est sûre. Ensuite, tu regardes brièvement si la personne réagit et si elle **respire** encore. Si ce n'est pas le cas, tu appelles immédiatement **l'ambulance** via le 112 et tu mets le téléphone en mode haut-parleur. Commence la **réanimation** et demande à quelqu'un d'aller chercher un DAE. Ensuite, suis toutes les étapes et les **instructies** de l'appareil jusqu'à l'arrivée des secours.*

1. Wat moet je eerst doen voordat je het slachtoffer aanraakt?
 - a. Een AED aansluiten
 - b. Kijken of het veilig is om te benaderen
 - c. Direct twee keer beademen
 - d. De borstkas dertig keer indrukken
2. Wat doe je als het slachtoffer niet ademt?
 - a. Je gaat naast hem zitten en start met borstcompressies
 - b. Je wacht tot de ambulance er is zonder iets te doen
 - c. Je legt het slachtoffer rechtop om beter te laten ademen
 - d. Je geeft hem meteen water zodat hij bijkomt

1-b 2-a

2. Votre partenaire devient soudainement étourdi à la maison et manque de s'évanouir.

Tâche: Schrijf wanneer je 112 belt, wanneer je de huisartsen-spoedpost belt en wat je doet als je twijfelt of je snel een arts nodig hebt.

URL: Spoed

Use in your answer: noodgeval / levensgevaar / bel 112 / huisartsen-spoedpost / op werkdagen overdag / bij twijfel