

Dentisterie 13 Spoedgevallen tandartspraktijk



- Veelvoorkomende tandheelkundige noodgevallen
- Simuleer een klinische noodsituatie met een nauwkeurige diagnose en behandelstappen

Het abces	<i>(L'abcès)</i>	De gebroken tand	<i>(La dent cassée)</i>
De pusfistel	<i>(La fistule purulente)</i>	De loszittende kroon	<i>(La couronne détachée)</i>
De aften	<i>(Les aphtes)</i>	De te hoge vulling	<i>(Occlusion élevée après obturation)</i>
De slechte adem	<i>(La mauvaise haleine)</i>	De nabloeding na extractie	<i>(Le saignement persistant après extraction)</i>
De tandvlesbloeding	<i>(Le saignement des gencives)</i>	Bijtmond bij een kind	<i>(Plaie de morsure chez un enfant)</i>
De tandgevoeligheid	<i>(La sensibilité dentaire)</i>	Wond door de prothese	<i>(Lésion causée par une prothèse)</i>
De tandmobiliteit	<i>(La mobilité dentaire)</i>	De gebroken prothese	<i>(La prothèse cassée)</i>
Pijn door een cariës	<i>(Douleur due à une carie)</i>		

1. Scannez le code QR pour regarder la vidéo, ou lire le texte.



1. Waardoor krijgen veel volwassenen last van gevoelige tanden?
 - a. Door te weinig tandenpoetsen en nooit floss te gebruiken
 - b. Door elke dag een mondspoeling met alcohol te gebruiken
 - c. Door alleen 's avonds water te drinken
 - d. Door teruggetrokken tandvles, te hard poetsen of bepaalde eetgewoontes
2. Wat gebeurt er als het dentine bloot komt te liggen?
 - a. Het tandvles groeit vanzelf weer over de tand
 - b. Prikkelers kunnen via de dentinetubuli de zenuw bereiken
 - c. De tand wordt vanzelf harder en sterker
 - d. Er ontstaat geen scherpe pijn meer
3. Wat doet de tandarts eerst bij deze patiënt met gevoeligheid?
 - a. Hij begint zonder uitleg met boren
 - b. Hij trekt meteen de gevoelige tand
 - c. Hij verwijst de patiënt direct naar een kaakchirurg
 - d. Hij stelt de oorzaak van de gevoeligheid vast
4. Hoe werkt Teethmate Desensitizer om gevoeligheid te verminderen?
 - a. Het verwijdert een deel van het tandglazuur
 - b. Het vervangt gevoelige tanden door kronen
 - c. Het sluit de dentinetubuli af door de vorming van hydroxyapatiet
 - d. Het maakt het tandvles tijdelijk gevoelloos met verdooving

1-d 2-b 3-d 4-c

2.Exercices



1. Associez les éléments qui ont un sens lié.

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| a. het abces | 1. een holte met pus |
| b. de slechte adem | 2. een tand die kapot is |
| c. de tandvleesbloeding | 3. bloedend tandvlees |
| d. de gebroken tand | 4. een vieze adem |

a-1 b-4 c-3 d-2

2. Urgence chez le dentiste (message pratique) (Audio disponible dans l'application)

Remplissez les lacunes: cariès, abces, gebroken, tandvleesbloeding, bijtzwond, loszittende, pusfistel, nabloeding

Tandartspraktijk Centrum – Spoedhulp

Bel ons bij hevige pijn of bij zwelling. Als het mogelijk is, geven we dezelfde dag een spoedafspraak. Vaak gaat het om pijn door _____, een _____ tand of een _____ kroon. Bij zwelling met een vieze smaak kan er een _____ zijn; soms is er een _____ in het tandvlees. Na een extractie kan een _____ optreden. Bij een _____ bij een kind of bij een _____ die niet stopt: neem direct contact op.

Wat kunt u thuis doen? Spoel voorzichtig met lauw water en poets zacht. Vermijd warmte op de pijnlijke plek. Bij gevoelige tanden kan te hard poetsen de klachten verergeren. Neem bij pijn zo nodig paracetamol volgens de bijsluiter. Bel 112 bij benauwdheid, snel toenemende zwelling of koorts.

Cabinet dentaire Centre – Urgences

Appelez-nous en cas de douleur intense ou de gonflement. Si possible, nous proposons un rendez vous d'urgence le jour-même. Il s'agit souvent d'une douleur due à une carie, à une dent cassée ou à une couronne qui bouge. En cas de gonflement accompagné d'un mauvais goût, il peut s'agir d'un abcès ; il y a parfois une fistule purulente dans la gencive. Après une extraction, un saignement post opératoire peut survenir. En cas de morsure chez un enfant ou de saignement des gencives qui ne s'arrête pas : contactez-nous immédiatement.

Que pouvez vous faire à la maison ? Rincez délicatement avec de l'eau tiède et brossez doucement. Évitez d'appliquer de la chaleur sur la zone douloureuse. En cas de sensibilité dentaire, un brossage trop vigoureux peut aggraver les symptômes. Prenez du paracétamol si nécessaire, en respectant la notice. Appelez le 112 en cas d'essoufflement, de gonflement qui augmente rapidement ou de fièvre.

1. Welke drie voorbeelden van oorzaken voor hevige tandpijn noemt de praktijk?

2. Welke twee dingen raadt de tekst aan om thuis te doen bij tandpijn of zwelling?

3. Écoutez le fragment audio et indiquez si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses.

- De patiënt heeft kiespijn door een cariës en zijn tandvlees bloedt tijdens het poetsen.
De patiënt ziet pus bij de pijnlijke plek, dus er is een pusfistel.
De spoedafpraak is vandaag om twee uur 's middags gepland.

Vrai Faux

-



4. Choisissez la bonne solution

1. De patiënt _____ omdat hij plotseling veel pijn door cariës heeft. *(Le patient appelle parce qu'il a soudainement très mal à cause d'une carie.)*
a. bel b. bellen c. belde d. belt
2. Ik _____ meteen of het tandvlees nog bloedt na de extractie. *(Je vérifie immédiatement si la gencive saigne encore après l'extraction.)*
a. keek b. kijk c. kijken d. kijkt
3. De assistent _____ of de patiënt last heeft van slechte adem en een abces. *(L'assistant demande si le patient souffre de mauvaise haleine et d'un abcès.)*
a. vraag b. vraagt c. vroeg d. vragen

1. belt 2. kijkt 3. vraagt

5. Lisez le dialogue et répondez aux questions

Patiënt: *Hallo, ik ben net thuis na het trekken van een kies en ik heb nog steeds een nabloeding. Is dat normaal?*
(Bonjour, je viens de rentrer chez moi après l'extraction d'une molaire et j'ai encore un saignement. Est-ce normal ?)

Tandartsassistente: *Een beetje bloed is normaal, maar bij aanhoudende bloedingen: bijt 30 minuten stevig op een gaasje en spoel niet met water.*
(Un peu de sang est normal, mais en cas de saignement persistant : mordez fermement sur une compresse pendant 30 minutes et ne rincez pas la bouche.)

Patiënt: *Ik gebruik bloedverduppers en ik proef steeds bloed in mijn mond. Ik maak me zorgen.*
(Je prends des anticoagulants et je sens constamment du sang dans la bouche. Je suis inquiet.)

Tandartsassistente: *Als het na die 30 minuten nog bloedt, willen we u vandaag nog zien op de spoedpost; neem uw medicijnlijst mee.*
(Si ça saigne encore après ces 30 minutes, nous souhaitons vous voir aujourd'hui aux urgences ; apportez la liste de vos médicaments.)

1. Waarom belt de patiënt de tandartspraktijk?

2. Welke twee instructies geeft de assistente om de bloeding te stoppen?



6. Répondez aux questions en utilisant le vocabulaire de ce chapitre.

Kunt u mij vertellen sinds wanneer u last heeft? / Ik denk dat het gaat om ..., daarom adviseer ik ... / Als u hevige pijn of koorts heeft, neem dan direct contact op voor een spoedafpraak.

1. Een patiënt belt voor een spoedafpraak omdat hij erge pijn heeft door cariës. Welke twee vragen stelt u en welk advies geeft u tot de afspraak?

2. Tijdens de controle ziet u een tandvleesbloeding en de patiënt zegt dat hij ook last heeft van een slechte adem. Wat zegt u tegen de patiënt en wat is de volgende stap?

7. E-mail (interne, cabinet dentaire)

Onderwerp: Spoedpatiënt vanmiddag

Hoi,

Ik had zojuist een man aan de telefoon met **hevige pijn door cariës** linksboven. Hij zegt dat de kies sinds de vulling van vorige week "hoog" aanvoelt en dat hij ook **tandvleesbloeding** heeft bij het poetsen. Geen koorts, wel gevoelig voor koud. Kun jij hem om 16:30 zien? Wat wil je dat ik alvast aan hem doorgeef?

Groet,

Lisa (balie)



Rédigez une réponse appropriée: *Kun je mij nog zeggen of de pijn constant is of alleen bij koud/warm? / Wil je dat ik tegen de patiënt zeg dat hij niet op die kant moet kauwen? / Ik kan hem om 16:30 inplannen, is dat oké?*
