

# Dentistry 9.1 Questions préopératoires et instructions post-opératoires



Questions préopératoires et instructions post-opératoires

<https://app.colanguage.com/french/dialogues/questions-preoperatoires>

## 1. Watch the video and answer the related questions.

Video: [https://www.youtu.be/L7GO7Wi6L\\_s](https://www.youtu.be/L7GO7Wi6L_s)

|  |  |                                  |                               |
|--|--|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>Arracher une dent de sagesse</b>        | <i>(Removing a wisdom tooth)</i>           | <b>Un levier</b>                 | <i>(A lever)</i>              |
| <b>Anesthésier</b>                         | <i>(Numbing the area)</i>                  | <b>Les racines</b>               | <i>(The roots)</i>            |
| <b>Incision de la gencive</b>              | <i>(Incision in the gum)</i>               | <b>Enlever les débris osseux</b> | <i>(Removing bone debris)</i> |
| <b>La dent est enfouie dans l'os</b>       | <i>(The tooth is embedded in the bone)</i> | <b>Une éponge hémostatique</b>   | <i>(A hemostatic sponge)</i>  |
| <b>Creuser l'os pour accéder à la dent</b> | <i>(Removing bone to access the tooth)</i> | <b>Un fil résorbable</b>         | <i>(An absorbable suture)</i> |

- Pourquoi le dentiste anesthésie-t-il la zone avant l'extraction ?
  - Pour éviter toute infection
  - Pour rendre la dent plus blanche
  - Pour empêcher le patient de parler pendant l'opération
  - Pour que l'intervention soit indolore pour le patient
- Que fait le chirurgien après l'incision de la gencive ?
  - Il donne un anesthésique oral au patient
  - Il pose immédiatement un fil résorbable
  - Il soulève un petit volet gingival
  - Il retire la dent sans autre manipulation
- Dans quel cas faut-il creuser l'os pour accéder à la dent ?
  - Quand la dent est déjà sortie
  - Quand la gencive est saine
  - Quand la dent est enfouie dans l'os
  - Quand le patient est allergique aux anesthésiques
- Quel est le rôle principal de l'éponge hémostatique pendant l'intervention ?
  - Nettoyer la bouche du patient
  - Aider à contrôler le saignement dans la zone opérée
  - Anesthésier la zone
  - Remplacer la dent retirée

1-d 2-c 3-c 4-b

## 2. Read the dialogue and answer the questions.

Extraction dentaire et saignement chez un patient sous anticoagulants

*Tooth extraction and bleeding in a patient on anticoagulants*

**Patient:** Docteur, je prends des anticoagulants. Est-ce que je vais beaucoup saigner ? *(Doctor, I take anticoagulants. Will I bleed a lot?)*

|   |   |
|---|---|
| <b>Dentiste:</b> Ne vous inquiétez pas, nous prendrons toutes les précautions nécessaires pour avoir une bonne hémostasie.                              | <i>(Don't worry, we'll take every necessary precaution to ensure good hemostasis.)</i>  |
| <b>Patient:</b> Quel type d'anesthésie allez-vous utiliser ?  | <i>(What kind of anesthesia will you use?)</i>  |
| <b>Dentiste:</b> Nous utiliserons une anesthésie locale à base d'articaine. Cela va aussi aider à réduire le saignement dans la zone chirurgicale.      | <i>(We'll use a local anesthetic containing articaine. It will also help reduce bleeding in the surgical area.)</i>             |
| <b>Patient:</b> Et comment allez-vous contrôler le saignement ?   | <i>(And how will you control the bleeding?)</i>   |
| <b>Dentiste:</b> Nous placerons une éponge hémostatique dans l'alvéole et nous ferons quelques points de suture pour assurer une bonne coagulation.     | <i>(We'll place a hemostatic sponge in the socket and put in a few sutures to promote proper clotting.)</i>                     |
| <b>Patient:</b> Et après l'intervention ?   | <i>(And after the procedure?)</i>   |
| <b>Dentiste:</b> Je mettrai une compresse que vous devrez mordre pendant trente minutes.  | <i>(I'll place a gauze pad for you to bite on for thirty minutes.)</i>  |
| <b>Patient:</b> Que dois-je faire si je saigne encore ?   | <i>(What should I do if I'm still bleeding?)</i>  |
| <b>Dentiste:</b> Vous remettez une autre compresse et vous mordez encore pendant trente minutes. Si le saignement persiste, vous revenez à la clinique. | <i>(Put in another gauze pad and bite down for another thirty minutes. If the bleeding continues, come back to the clinic.)</i> |
| <b>Patient:</b> Merci beaucoup, docteur.  | <i>(Thank you very much, doctor.)</i>   |
| <b>Dentiste:</b> Je pourrai aussi placer une compresse avec de l'Amchafibrine pour arrêter le saignement. Ne vous inquiétez pas.                        | <i>(I can also place a gauze soaked with Amchafibrin to help stop the bleeding. Don't worry.)</i>                               |

1. Que prend le patient comme médicament ?

- a. Il prend des anticoagulants.
- b. Il prend des antibiotiques.
- c. Il prend des antalgiques.
- d. Il prend des somnifères.

2. Quel type d'anesthésie la dentiste va-t-elle utiliser ?

- a. Une sédation intraveineuse profonde.
- b. Aucune anesthésie, seulement une compresse froide.
- c. Une anesthésie générale à l'hôpital.
- d. Une anesthésie locale à base d'articaine.

**1-a 2-d**

**3. Quels sont les facteurs de risque et les mesures préventives que vous discutez avec un patient avant une extraction dentaire afin de réduire le risque de complications postopératoires ?**

1. <https://www.dentaly.org/extraction-dentaire-tout-savoir-avant-de-se-faire-arracher-une-dent/>