

Dentistry 9.1 Questions préopératoires et instructions post-opératoires

Questions préopératoires et instructions post-opératoires



1. Watch the video and answer the related questions.

Video: https://www.youtu.be/L7GO7Wi6l_s

Arracher une dent de sagesse	<i>(Removing a wisdom tooth)</i>	Un levier	<i>(A lever)</i>
Anesthésier	<i>(Numbing the area)</i>	Les racines	<i>(The roots)</i>
Incision de la gencive	<i>(Incision in the gum)</i>	Enlever les débris osseux	<i>(Removing bone debris)</i>
La dent est enfouie dans l'os	<i>(The tooth is embedded in the bone)</i>	Une éponge hémostatique	<i>(A hemostatic sponge)</i>
Creuser l'os pour accéder à la dent	<i>(Removing bone to access the tooth)</i>	Un fil résorbable	<i>(An absorbable suture)</i>

1. Pourquoi le dentiste anesthésie-t-il la zone avant l'extraction ?
 - a. Pour que l'intervention soit indolore pour le patient
 - b. Pour rendre la dent plus blanche
 - c. Pour empêcher le patient de parler pendant l'opération
 - d. Pour éviter toute infection
2. Que fait le chirurgien après l'incision de la gencive ?
 - a. Il pose immédiatement un fil résorbable
 - b. Il donne un anesthésique oral au patient
 - c. Il soulève un petit volet gingival
 - d. Il retire la dent sans autre manipulation
3. Dans quel cas faut-il creuser l'os pour accéder à la dent ?
 - a. Quand la dent est enfouie dans l'os
 - b. Quand la gencive est saine
 - c. Quand la dent est déjà sortie
 - d. Quand le patient est allergique aux anesthésiques
4. Quel est le rôle principal de l'éponge hémostatique pendant l'intervention ?
 - a. Nettoyer la bouche du patient
 - b. Anesthésier la zone
 - c. Remplacer la dent retirée
 - d. Aider à contrôler le saignement dans la zone opérée

1-a 2-c 3-a 4-d

2. Read the dialogue and answer the questions.

Extraction dentaire et saignement chez un patient sous anticoagulants

Tooth extraction and bleeding in a patient on anticoagulants

Patient: Docteur, je prends des anticoagulants. Est-ce que je vais beaucoup saigner ? *(Doctor, I take anticoagulants. Will I bleed a lot?)*

Dentiste: Ne vous inquiétez pas, nous prendrons toutes les précautions nécessaires pour avoir une bonne hémostase.	<i>(Don't worry, we'll take every necessary precaution to ensure good hemostasis.)</i>
Patient: Quel type d'anesthésie allez-vous utiliser ?	<i>(What kind of anesthesia will you use?)</i>
Dentiste: Nous utiliserons une anesthésie locale à base d'articaine. Cela va aussi aider à réduire le saignement dans la zone chirurgicale.	<i>(We'll use a local anesthetic containing articaine. It will also help reduce bleeding in the surgical area.)</i>
Patient: Et comment allez-vous contrôler le saignement ?	<i>(And how will you control the bleeding?)</i>
Dentiste: Nous placerons une éponge hémostatique dans l'alvéole et nous ferons quelques points de suture pour assurer une bonne coagulation.	<i>(We'll place a hemostatic sponge in the socket and put in a few sutures to promote proper clotting.)</i>
Patient: Et après l'intervention ?	<i>(And after the procedure?)</i>
Dentiste: Je mettrai une compresse que vous devrez mordre pendant trente minutes.	<i>(I'll place a gauze pad for you to bite on for thirty minutes.)</i>
Patient: Que dois-je faire si je saigne encore ?	<i>(What should I do if I'm still bleeding?)</i>
Dentiste: Vous remettez une autre compresse et vous mordez encore pendant trente minutes. Si le saignement persiste, vous revenez à la clinique.	<i>(Put in another gauze pad and bite down for another thirty minutes. If the bleeding continues, come back to the clinic.)</i>
Patient: Merci beaucoup, docteur.	<i>(Thank you very much, doctor.)</i>
Dentiste: Je pourrai aussi placer une compresse avec de l'Amchafibrine pour arrêter le saignement. Ne vous inquiétez pas.	<i>(I can also place a gauze soaked with Amchafibrin to help stop the bleeding. Don't worry.)</i>

1. Que prend le patient comme médicament ?

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| a. Il prend des antalgiques. | b. Il prend des somnifères. |
| c. Il prend des anticoagulants. | d. Il prend des antibiotiques. |

2. Quel type d'anesthésie la dentiste va-t-elle utiliser ?

- | | |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| a. Une sédation intraveineuse profonde. | b. Une anesthésie générale à l'hôpital. |
| c. Aucune anesthésie, seulement une compresse froide. | d. Une anesthésie locale à base d'articaine. |

1-c 2-d