

Odontoiatria 8.1 Traitement de la parodontite

Trattamento della parodontite

<https://app.colanguage.com/it/francese/dialoghi/traitament-parodontite>



1. Guarda il video e rispondi alle domande correlate.

Video: <https://www.youtube.com/watch?v=pdVdovZgg7A>

Parodontite	(<i>Parodontite</i>)	Altération de l'os	(<i>Alterazione dell'osso</i>)
Infection	(<i>Infezione</i>)	Prévention	(<i>Prevenzione</i>)
Tissus de soutien	(<i>Tessuti di supporto</i>)	Brossage des dents	(<i>Spazzolamento dei denti</i>)
Dent	(<i>Dente</i>)	Avant de se coucher	(<i>Prima di coricarsi</i>)
Gencive	(<i>Gengiva</i>)	Consultation régulière	(<i>Controllo regolare</i>)
Os	(<i>Osso</i>)	Dentiste	(<i>Dentista</i>)
Origine bactérienne	(<i>Origine batterica</i>)	Nettoyage plus profond	(<i>Pulizia più profonda</i>)
Hygiène bucco-dentaire	(<i>Igiene orale</i>)	Sous la gencive	(<i>Sotto la gengiva</i>)
Hygiène insuffisante	(<i>Igiene insufficiente</i>)	Curetage-surface	(<i>Curettage surfacing</i>)
Infection virale	(<i>Infezione virale</i>)	Ultrasons	(<i>Ultrasuoni</i>)
Accumulation de bactéries	(<i>Accumulo di batteri</i>)	Curettes	(<i>Curette</i>)
Soins personnels	(<i>Cure personali</i>)	Anesthésie locale	(<i>Anestesia locale</i>)
Détartrage	(<i>Detartrasi</i>)	Douleur	(<i>Dolore</i>)
Détartrages réguliers	(<i>Detartrasi regolari</i>)	Prise en charge	(<i>Gestione</i>)
Développement de la maladie	(<i>Sviluppo della malattia</i>)	Jeunes adultes	(<i>Giovani adulti</i>)
Altération de la gencive	(<i>Alterazione della gengiva</i>)	Population	(<i>Popolazione</i>)

1. Quelle est la cause la plus fréquente de la parodontite ?

- a. Une carence en vitamines
- b. Une origine bactérienne liée à une mauvaise hygiène bucco-dentaire
- c. Une allergie au dentifrice
- d. Un traumatisme causé par le brossage des dents

2. Quel geste de prévention est conseillé le soir ?

- a. Se brosser les dents avant de se coucher
- b. Utiliser seulement un bain de bouche
- c. Manger un yaourt avant de dormir
- d. Boire beaucoup d'eau après le dîner

3. Quand un nettoyage plus profond sous la gencive devient-il nécessaire ?

- a. Lors de la première visite chez le dentiste
- b. Uniquement chez les personnes âgées
- c. Lorsque la maladie parodontale est installée
- d. Après une intervention chirurgicale

4. Comment se déroule le curetage-surfaçage en termes de confort pour le patient ?
- Sous anesthésie générale à l'hôpital
 - Sous anesthésie locale et généralement sans douleur
 - Sous anesthésie et très douloureux
 - Avec seulement des médicaments antidouleur à la maison

1-b 2-a 3-c 4-c

2. Leggi il dialogo e rispondi alle domande.

Parodontite : traitement et hygiène à la maison

Parodontite: trattamento e igiene a casa

- Le patient:** Docteur, dans une autre clinique, on m'a dit qu'il fallait extraire toutes mes dents à cause d'une parodontite.
- (Dottore, in un altro studio mi hanno detto che bisognava estrarre tutti i miei denti a causa di una parodontite.)*
- La dentiste:** J'ai examiné votre cas et ce n'est pas nécessaire. Nous pouvons traiter vos dents avec un protocole parodontal adapté.
- (Ho esaminato il suo caso e non è necessario. Possiamo curare i suoi denti con un protocollo parodontale adeguato.)*
- Le patient:** D'accord. Pourriez-vous m'expliquer en quoi consiste ce traitement ?
- (Va bene. Potrebbe spiegarmi in cosa consiste questo trattamento?)*
- La dentiste:** Nous allons commencer par un bilan parodontal, en mesurant la profondeur des poches avec une sonde parodontale.
- (Inizieremo con una valutazione parodontale, misurando la profondità delle tasche con una sonda parodontale.)*
- Le patient:** Je vois. Quelle est la prochaine étape après le bilan ?
- (Capisco. Qual è la fase successiva dopo la valutazione?)*
- La dentiste:** Nous réaliserons ensuite un surfaçage radiculaire sous anesthésie locale, en une ou deux séances.
- (Eseguiremo poi un levigamento radicolare in anestesia locale, in una o due sedute.)*
- Le patient:** Est-ce que cela peut stopper la maladie ?
- (Questo può arrestare la malattia?)*
- La dentiste:** Oui, si vous gardez une hygiène rigoureuse et si vous venez régulièrement aux contrôles, le pronostic sera favorable.
- (Si, se mantiene un'igiene scrupolosa e si presenta regolarmente ai controlli, la prognosi sarà favorevole.)*
- Le patient:** Et à la maison, quels soins dois-je suivre exactement ?
- (E a casa, quali cure devo seguire esattamente?)*
- La dentiste:** Brossez-vous les dents au moins deux fois par jour, trois fois c'est l'idéal. Utilisez aussi le fil dentaire chaque soir, et si besoin des brossettes interdentaires.
- (Si lavi i denti almeno due volte al giorno; l'ideale è tre. Utilizzi anche il filo interdentale ogni sera e, se necessario, gli scovolini interdentali.)*

1. instruction

- a. Lisez le dialogue entre le patient et la dentiste, puis répondez aux questions à choix multiple.

Choisissez la meilleure réponse pour chaque question.

2. 1. Que proposait l'autre clinique au patient ?

- a. D'utiliser seulement des bains de bouche à la chlorhexidine
- b. De faire un simple détartrage avec ultrasons
- c. De faire tout de suite une chirurgie parodontale
- d. D'extraire toutes ses dents à cause de la parodontite

1-a 2-d

3. Expliquez à un patient ce qu'est le détartrage et le surfaçage radiculaire, en décrivant les objectifs du traitement et son déroulement de manière claire et rassurante.

1. <https://www.colgate.com/fr-ca/oral-health/gum-disease/what-dentists-do-when-root-planing-and-scaling-teeth>