

# Odontoiatria 9.1 Questions préopératoires et instructions post-opératoires

Domande preoperatorie e istruzioni postoperatorie



1. Pourquoi le dentiste anesthésie-t-il la zone avant l'extraction ?
  - a. Pour que l'intervention soit indolore pour le patient
  - b. Pour éviter toute infection
  - c. Pour rendre la dent plus blanche
  - d. Pour empêcher le patient de parler pendant l'opération
2. Que fait le chirurgien après l'incision de la gencive ?
  - a. Il soulève un petit volet gingival
  - b. Il pose immédiatement un fil résorbable
  - c. Il donne un anesthésique oral au patient
  - d. Il retire la dent sans autre manipulation

1-a 2-a

## 2. Leggi il dialogo e rispondi alle domande.

### Extraction dentaire et saignement chez un patient sous anticoagulants

*Estrazione dentale e sanguinamento in un paziente in trattamento anticoagulante*

- Patient:** Docteur, je prends des anticoagulants. Est-ce que je vais beaucoup saigner ? *(Dottore, prendo degli anticoagulanti. Sanguinerò molto?)*
- Dentiste:** Ne vous inquiétez pas, nous prendrons toutes les précautions nécessaires pour avoir une bonne hémostase. *(Non si preoccupi, adotteremo tutte le precauzioni necessarie per ottenere una buona emostasi.)*
- Patient:** Quel type d'anesthésie allez-vous utiliser ? *(Che tipo di anestesia userete?)*
- Dentiste:** Nous utiliserons une anesthésie locale à base d'articaine. Cela va aussi aider à réduire le saignement dans la zone chirurgicale. *(Useremo un'anestesia locale a base di articaina. Questo contribuirà anche a ridurre il sanguinamento nella zona chirurgica.)*
- Patient:** Et comment allez-vous contrôler le saignement ? *(E come controllerete il sanguinamento?)*
- Dentiste:** Nous placerons une éponge hémostatique dans l'alvéole et nous ferons quelques points de suture pour assurer une bonne coagulation. *(Posizioneremo una spugna emostatica nell'alveolo e faremo alcuni punti di sutura per favorire la coagulazione.)*
- Patient:** Et après l'intervention ? *(E dopo l'intervento?)*
- Dentiste:** Je mettrai une compresse que vous devrez mordre pendant trente minutes. *(Le metterò una garza che dovrà mordere per trenta minuti.)*
- Patient:** Que dois-je faire si je saigne encore ? *(Cosa devo fare se continuo a sanguinare?)*
- Dentiste:** Vous remettez une autre compresse et vous mordez encore pendant trente minutes. Si le saignement persiste, vous revenez à la clinique. *(Metta un'altra garza e morda ancora per trenta minuti. Se il sanguinamento persiste, torni in clinica.)*
- Patient:** Merci beaucoup, docteur. *(Grazie mille, dottore.)*

**Dentiste:** Je pourrai aussi placer une compresse avec de l'Amchafibrine pour arrêter le saignement. Ne vous inquiétez pas.

*(Posso anche applicare una garza con Amchafibrin per fermare il sanguinamento. Non si preoccupi.)*

1. Que prend le patient comme médicament ? *(Quale farmaco prende il paziente?)*
  - a. Il prend des somnifères.
  - b. Il prend des antalgiques.
  - c. Il prend des anticoagulants.
  - d. Il prend des antibiotiques.
2. Quel type d'anesthésie la dentiste va-t-elle utiliser ? *(Che tipo di anestesia userà la dentista?)*
  - a. Une anesthésie générale à l'hôpital.
  - b. Aucune anesthésie, seulement une compresse froide.
  - c. Une anesthésie locale à base d'articaine.
  - d. Une sédation intraveineuse profonde.

**1-c 2-c**