

Odontoiatria 9.1 Questions préopératoires et instructions post-opératoires



Domande preoperatorie e istruzioni postoperatorie

<https://app.colanguage.com/it/francese/dialoghi/questions-preoperatoires>

1. Guarda il video e rispondi alle domande correlate.

Video: https://wwwyoutu.be/L7GO7Wi6l_s

Arracher une dent de sagesse	(Eseguire l'estrazione di un dente del giudizio)	Un levier	(Una leva)
Anesthésier	(Anestetizzare)	Les racines	(Le radici)
Incision de la gencive	(Incisione della gengiva)	Enlever les débris osseux	(Rimuovere i detriti ossei)
La dent est enfouie dans l'os	(Il dente è incorporato nell'osso)	Une éponge hémostatique	(Una spugna emostatica)
Creuser l'os pour accéder à la dent	(Scavare l'os per raggiungere il dente)	Un fil résorbable	(Un filo riassorbibile)

- Pourquoi le dentiste anesthésie-t-il la zone avant l'extraction ?
 - Pour empêcher le patient de parler pendant l'opération
 - Pour éviter toute infection
 - Pour rendre la dent plus blanche
 - Pour que l'intervention soit indolore pour le patient
- Que fait le chirurgien après l'incision de la gencive ?
 - Il soulève un petit volet gingival
 - Il pose immédiatement un fil résorbable
 - Il donne un anesthésique oral au patient
 - Il retire la dent sans autre manipulation
- Dans quel cas faut-il creuser l'os pour accéder à la dent ?
 - Quand la dent est déjà sortie
 - Quand la gencive est saine
 - Quand la dent est enfouie dans l'os
 - Quand le patient est allergique aux anesthésiques
- Quel est le rôle principal de l'éponge hémostatique pendant l'intervention ?
 - Aider à contrôler le saignement dans la zone opérée
 - Remplacer la dent retirée
 - Anesthésier la zone
 - Nettoyer la bouche du patient

1-d 2-a 3-c 4-a

2. Leggi il dialogo e rispondi alle domande.

Extraction dentaire et saignement chez un patient sous anticoagulants

Estrazione dentale e sanguinamento in un paziente in trattamento anticoagulante

Patient: Docteur, je prends des anticoagulants. Est-ce que je vais beaucoup saigner ? *(Dottore, prendo degli anticoagulanti. Sanguinerò molto?)*

Dentiste: Ne vous inquiétez pas, nous prendrons toutes les précautions nécessaires pour avoir une bonne hémostase.	(Non si preoccupi, adotteremo tutte le precauzioni necessarie per ottenere una buona emostasi.)
Patient: Quel type d'anesthésie allez-vous utiliser ?	(Che tipo di anestesia userete?)
Dentiste: Nous utiliserons une anesthésie locale à base d'articaïne. Cela va aussi aider à réduire le saignement dans la zone chirurgicale.	(Useremo un'anestesia locale a base di articina. Questo contribuirà anche a ridurre il sanguinamento nella zona chirurgica.)
Patient: Et comment allez-vous contrôler le saignement ?	(E come controllerete il sanguinamento?)
Dentiste: Nous placerons une éponge hémostatique dans l'alvéole et nous ferons quelques points de suture pour assurer une bonne coagulation.	(Posizioneremo una spugna emostatica nell'alveolo e faremo alcuni punti di sutura per favorire la coagulazione.)
Patient: Et après l'intervention ?	(E dopo l'intervento?)
Dentiste: Je mettrai une compresse que vous devrez mordre pendant trente minutes.	(Le metterò una garza che dovrà mordere per trenta minuti.)
Patient: Que dois-je faire si je saigne encore ?	(Cosa devo fare se continuo a sanguinare?)
Dentiste: Vous remettez une autre compresse et vous mordez encore pendant trente minutes. Si le saignement persiste, vous revenez à la clinique.	(Metta un'altra garza e morda ancora per trenta minuti. Se il sanguinamento persiste, torni in clinica.)
Patient: Merci beaucoup, docteur.	(Grazie mille, dottore.)
Dentiste: Je pourrai aussi placer une compresse avec de l'Amchafibrine pour arrêter le saignement. Ne vous inquiétez pas.	(Posso anche applicare una garza con Amchafibrin per fermare il sanguinamento. Non si preoccupi.)

1. Que prend le patient comme médicament ?
 - a. Il prend des antalgiques.
 - b. Il prend des antibiotiques.
 - c. Il prend des anticoagulants.
 - d. Il prend des somnifères.

2. Quel type d'anesthésie la dentiste va-t-elle utiliser ?
 - a. Une anesthésie générale à l'hôpital.
 - b. Une sédation intraveineuse profonde.
 - c. Une anesthésie locale à base d'articaïne.
 - d. Aucune anesthésie, seulement une compresse froide.

1-c 2-c

3. Quels sont les facteurs de risque et les mesures préventives que vous discutez avec un patient avant une extraction dentaire afin de réduire le risque de complications postopératoires ?

1. <https://www.dentaly.org/extraction-dentaire-tout-savoir-avant-de-se-faire-arracher-une-dent/>