

Odontoiatria 9.1 Preoperatieve vragen en postoperatieve instructies

Domande preoperatorie e istruzioni postoperatorie



1. Wat is het doel van de afspraak bij de specialist?
 - a. Een gaatje vullen in een kies
 - b. Een beugel laten plaatsen
 - c. Een verstandskies laten verwijderen
 - d. Een controle van het gebit
2. Welke verdoving wordt gebruikt tijdens de behandeling?
 - a. Een verdovende zalf op het tandvlees
 - b. Plaatselijke verdoving met een paar prikjes
 - c. Algehele narcose in het ziekenhuis
 - d. Een pijnstiller in tabletvorm

1-c 2-b

2. Leggi il dialogo e rispondi alle domande.

Extractie en bloedverdunners

Estrazione e anticoagulanti

- Patiënt:** Dokter, ik gebruik bloedverdunners. Ga ik dan veel bloeden? *(Dottore, prendo anticoagulanti. Sanguinerò molto?)*
- Tandarts:** Maak u zich geen zorgen; we nemen alle voorzorgsmaatregelen om het bloeden goed te stoppen. *(Non si preoccupi; prendiamo tutte le precauzioni per fermare il sanguinamento.)*
- Patiënt:** Welke verdoving gaat u gebruiken? *(Quale anestesia userà?)*
- Tandarts:** We geven een lokale verdoving met articaïne. Dat helpt ook om het gebied minder te laten bloeden. *(Le faremo un'anestesia locale con articaina. Questo aiuta anche a ridurre il sanguinamento nell'area.)*
- Patiënt:** En hoe gaat u het bloeden tijdens de extractie stoppen? *(E come fermerà il sanguinamento durante l'estrazione?)*
- Tandarts:** We plaatsen een speciaal hemostatisch sponsje in de holte en we zetten een paar hechtingen om alles goed te sluiten. *(Inseriremo una spugna emostatica speciale nella cavità e faremo qualche punto di sutura per chiudere bene.)*
- Patiënt:** En wat gebeurt er na de ingreep? *(E cosa succede dopo l'intervento?)*
- Tandarts:** Ik leg een steriel gaasje op de wond. U moet daar dertig minuten stevig op bijten. *(Le metterò una garza sterile sulla ferita. Dovrà mordere con decisione su di essa per trenta minuti.)*
- Patiënt:** Wat moet ik doen als het toch blijft bloeden? *(Cosa devo fare se continua a sanguinare?)*
- Tandarts:** Plaats dan een nieuw steriel gaasje en bijt weer dertig minuten. Als het dan nog niet stopt, komt u terug naar de kliniek. *(Allora metta una nuova garza sterile e morda di nuovo per trenta minuti. Se non si ferma, torni in clinica.)*
- Patiënt:** Heel erg bedankt, dokter. *(Grazie mille, dottore.)*

Tandarts: Graag gedaan. We plaatsen ook een compres met *(Prego. Applicheremo anche una compressa con un prodotto chiamato Amchafibrine per aiutare a fermare ulteriormente il sanguinamento. Non si preoccupi.)* een product dat Amchafibrine heet om het bloeden extra te stoppen. Maak u geen zorgen.

1. Waar is de patiënt bang voor? *(Di cosa ha paura il paziente?)*
 - a. Voor pijn door de verdoving met articaïne
 - b. Voor veel bloeding tijdens de extractie
 - c. Voor schade door de chirurgische boor aan de verstandskies
 - d. Voor een infectie door de alveolaire curette
2. Welke verdoving gebruikt de tandarts? *(Quale anestesia usa il dentista?)*
 - a. Een lokale verdoving met articaïne
 - b. Geen verdoving, alleen een hemostatisch sponsje
 - c. Een algehele narcose met een lipspreider
 - d. Een verdoving gecombineerd met een steriel gaasje

1-b 2-a