

Tandheelkunde 8.1 Traitement de la parodontite

Behandeling van parodontitis

<https://app.colanguage.com/nl/frans/dialogen/traitement-parodontite>



1. Bekijk de video en beantwoord de bijbehorende vragen.

Video: <https://www.youtube.com/watch?v=pdVdovZgg7A>

Parodontite	(Parodontitis)	Altération de l'os	(Aantasting van het bot)
Infection	(Infektie)	Prévention	(Preventie)
Tissus de soutien	(Ondersteunend weefsel)	Brossage des dents	(Tanden poetsen)
Dent	(Tand)	Avant de se coucher	(Voor het slapengaan)
Gencive	(Tandvlees)	Consultation régulière	(Regelmatige controle)
Os	(Bot)	Dentiste	(Tandarts)
Origine bactérienne	(Bacteriële oorsprong)	Nettoyage plus profond	(Diepe reiniging)
Hygiène bucco-dentaire	(Mondhygiëne)	Sous la gencive	(Onder het tandvlees)
Hygiène insuffisante	(Onvoldoende mondhygiëne)	Curetage-surface	(Curetage en root planing)
Infection virale	(Virale infectie)	Ultrasons	(Ultrasoon)
Accumulation de bactéries	(Oopenhoping van bacteriën)	Curettes	(Curettes)
Soins personnels	(Persoonlijke verzorging)	Anesthésie locale	(Lokale verdoving)
Détartrage	(Tandsteenverwijdering)	Douleur	(Pijn)
Détartrages réguliers	(Regelmatige tartaraverwijdering)	Prise en charge	(Behandeling)
Développement de la maladie	(Ziekteontwikkeling)	Jeunes adultes	(Jonge volwassenen)
Altération de la gencive	(Aantasting van het tandvlees)	Population	(Bevolking)

1. Quelle est la cause la plus fréquente de la parodontite ?

- a. Une origine bactérienne liée à une mauvaise hygiène bucco-dentaire
- b. Une allergie au dentifrice
- c. Un traumatisme causé par le brossage des dents
- d. Une carence en vitamines

2. Quel geste de prévention est conseillé le soir ?

- a. Se brosser les dents avant de se coucher
- b. Utiliser seulement un bain de bouche
- c. Boire beaucoup d'eau après le dîner
- d. Manger un yaourt avant de dormir

3. Quand un nettoyage plus profond sous la gencive devient-il nécessaire ?

- a. Lors de la première visite chez le dentiste
- b. Lorsque la maladie parodontale est installée
- c. Après une intervention chirurgicale
- d. Uniquement chez les personnes âgées

4. Comment se déroule le curetage-surfaçage en termes de confort pour le patient ?
- Sous anesthésie générale à l'hôpital
 - Sans anesthésie et très douloureux
 - Sous anesthésie locale et généralement sans douleur
 - Avec seulement des médicaments antidouleur à la maison

1-a 2-a 3-b 4-c

2. Lees de dialoog en beantwoord de vragen.

Parodontite : traitement et hygiène à la maison

Parodontitis: behandeling en mondhygiëne thuis

Le patient: Docteur, dans une autre clinique, on m'a dit (*Dokter, in een andere kliniek heeft men mij gezegd dat al mijn tanden verwijderd moeten worden vanwege parodontitis.*)

qu'il fallait extraire toutes mes dents à cause d'une parodontite.

La dentiste: J'ai examiné votre cas et ce n'est pas nécessaire. Nous pouvons traiter vos dents avec un protocole parodontal adapté. (*Ik heb uw geval onderzocht en dat is niet nodig. We kunnen uw tanden behandelen met een aangepast parodontaal protocol.*)

Le patient: D'accord. Pourriez-vous m'expliquer en quoi consiste ce traitement ? (*Goed. Kunt u mij uitleggen waar die behandeling uit bestaat?*)

La dentiste: Nous allons commencer par un bilan parodontal, en mesurant la profondeur des poches avec une sonde parodontale. (*We beginnen met een parodontaal onderzoek, waarbij we de diepte van de pockets meten met een parodontale sonde.*)

Le patient: Je vois. Quelle est la prochaine étape après le bilan ? (*Ik begrijp het. Wat is de volgende stap na het onderzoek?*)

La dentiste: Nous réaliserons ensuite un surfaçage radiculaire sous anesthésie locale, en une ou deux séances. (*Vervolgens voeren we een worteloppervlaktebehandeling (root planing) uit onder lokale verdoving, in één of twee zittingen.*)

Le patient: Est-ce que cela peut stopper la maladie ? (*Kan dat de ziekte stoppen?*)

La dentiste: Oui, si vous gardez une hygiène rigoureuse et si vous venez régulièrement aux contrôles, le pronostic sera favorable. (*Ja. Als u een strikte mondhygiëne aanhoudt en regelmatig komt voor controles, is de prognose gunstig.*)

Le patient: Et à la maison, quels soins dois-je suivre exactement ? (*En thuis, welke verzorging moet ik precies volgen?*)

La dentiste: Brossez-vous les dents au moins deux fois par jour, trois fois c'est l'idéal. Utilisez aussi le fil dentaire chaque soir, et si besoin des brossettes interdentaires. (*Poets uw tanden minstens twee keer per dag; drie keer is ideaal. Gebruik ook elke avond floss en, indien nodig, interdentale borsteltjes.*)

1. instruction

- Lisez le dialogue entre le patient et la dentiste, puis répondez aux questions à choix multiple. Choisissez la meilleure réponse pour chaque question.

2. 1. Que proposait l'autre clinique au patient ?
- a. De faire un simple détartrage avec ultrasons
 - b. D'extraire toutes ses dents à cause de la parodontite
 - c. De faire tout de suite une chirurgie parodontale
 - d. D'utiliser seulement des bains de bouche à la chlorhexidine

1-a 2-b

3. Expliquez à un patient ce qu'est le détartrage et le surfaçage radiculaire, en décrivant les objectifs du traitement et son déroulement de manière claire et rassurante.

1. <https://www.colgate.com/fr-ca/oral-health/gum-disease/what-dentists-do-when-root-planing-and-scaling-teeth>