

Tandheelkunde 8.1 Traitement de la parodontite

Behandeling van parodontitis



1. Quelle est la cause la plus fréquente de la parodontite ?
 - a. Une allergie au dentifrice
 - b. Une origine bactérienne liée à une mauvaise hygiène bucco-dentaire
 - c. Un traumatisme causé par le brossage des dents
 - d. Une carence en vitamines
2. Quel geste de prévention est conseillé le soir ?
 - a. Manger un yaourt avant de dormir
 - b. Utiliser seulement un bain de bouche
 - c. Boire beaucoup d'eau après le dîner
 - d. Se brosser les dents avant de se coucher

1-b 2-d

2. Lees de dialoog en beantwoord de vragen.

Parodontite : traitement et hygiène à la maison

Parodontitis: behandeling en mondhygiëne thuis

- Le patient:** Docteur, dans une autre clinique, on m'a dit qu'il fallait extraire toutes mes dents à cause d'une parodontite.
- La dentiste:** J'ai examiné votre cas et ce n'est pas nécessaire. Nous pouvons traiter vos dents avec un protocole parodontal adapté.
- Le patient:** D'accord. Pourriez-vous m'expliquer en quoi consiste ce traitement ?
- La dentiste:** Nous allons commencer par un bilan parodontal, en mesurant la profondeur des poches avec une sonde parodontale.
- Le patient:** Je vois. Quelle est la prochaine étape après le bilan ?
- La dentiste:** Nous réaliserons ensuite un surfaçage radiculaire sous anesthésie locale, en une ou deux séances.
- Le patient:** Est-ce que cela peut stopper la maladie ?
- La dentiste:** Oui, si vous gardez une hygiène rigoureuse et si vous venez régulièrement aux contrôles, le pronostic sera favorable.
- Le patient:** Et à la maison, quels soins dois-je suivre exactement ?
- (Dokter, in een andere kliniek heeft men mij gezegd dat al mijn tanden verwijderd moeten worden vanwege parodontitis.)*
- (Ik heb uw geval onderzocht en dat is niet nodig. We kunnen uw tanden behandelen met een aangepast parodontaal protocol.)*
- (Goed. Kunt u mij uitleggen waar die behandeling uit bestaat?)*
- (We beginnen met een parodontaal onderzoek, waarbij we de diepte van de pockets meten met een parodontale sonde.)*
- (Ik begrijp het. Wat is de volgende stap na het onderzoek?)*
- (Vervolgens voeren we een worteloppervlaktebehandeling (root planing) uit onder lokale verdoving, in één of twee zittingen.)*
- (Kan dat de ziekte stoppen?)*
- (Ja. Als u een strikte mondhygiëne aanhoudt en regelmatig komt voor controles, is de prognose gunstig.)*
- (En thuis, welke verzorging moet ik precies volgen?)*

La dentiste: Brossez-vous les dents au moins deux fois par jour, trois fois c'est l'idéal. Utilisez aussi le fil dentaire chaque soir, et si besoin des brossettes interdentaires. *(Poets uw tanden minstens twee keer per dag; drie keer is ideaal. Gebruik ook elke avond floss en, indien nodig, interdentaal borsteltjes.)*

1. instruction *(instruction)*

a. Lisez le dialogue entre le patient et la dentiste, puis répondez aux questions à choix multiple. Choisissez la meilleure réponse pour chaque question.

2. 1. Que proposait l'autre clinique au patient ? *(1. Wat stelde de andere kliniek voor aan de patiënt?)*

- | | |
|--|--|
| a. D'utiliser seulement des bains de bouche à la chlorhexidine | b. D'extraire toutes ses dents à cause de la parodontite |
| c. De faire un simple détartrage avec ultrasons | d. De faire tout de suite une chirurgie parodontale |

1-a 2-b