

# Tandheelkunde 9.1 Questions préopératoires et instructions post-opératoires



Preoperatieve vragen en postoperatieve instructies

<https://app.colanguage.com/nl/frans/dialogen/questions-preoperatoires>

## 1. Bekijk de video en beantwoord de bijbehorende vragen.

Video: [https://wwwyoutu.be/L7GO7Wi6l\\_s](https://wwwyoutu.be/L7GO7Wi6l_s)

<b>Arracher une dent de sagesse</b>	(Een verstandskies trekken)	<b>Un levier</b>	(Een hefboominstrument)
<b>Anesthésier</b>	(Verdoven)	<b>Les racines</b>	(De wortels)
<b>Incision de la gencive</b>	(Incisie van het tandvlees)	<b>Enlever les débris osseux</b>	(Botresten verwijderen)
<b>La dent est enfouie dans l'os</b>	(De tand zit in het bot verborgen)	<b>Une éponge hémostatique</b>	(Een hemostatische spons)
<b>Creuser l'os pour accéder à la dent</b>	(Het bot wegfrezen om bij de tand te komen)	<b>Un fil résorbable</b>	(Een oplosbare hechting)

1. Pourquoi le dentiste anesthésie-t-il la zone avant l'extraction ?
  - a. Pour éviter toute infection
  - b. Pour rendre la dent plus blanche
  - c. Pour que l'intervention soit indolore pour le patient
  - d. Pour empêcher le patient de parler pendant l'opération
2. Que fait le chirurgien après l'incision de la gencive ?
  - a. Il donne un anesthésique oral au patient
  - b. Il pose immédiatement un fil résorbable
  - c. Il retire la dent sans autre manipulation
  - d. Il soulève un petit volet gingival
3. Dans quel cas faut-il creuser l'os pour accéder à la dent ?
  - a. Quand le patient est allergique aux anesthésiques
  - b. Quand la gencive est saine
  - c. Quand la dent est enfouie dans l'os
  - d. Quand la dent est déjà sortie
4. Quel est le rôle principal de l'éponge hémostatique pendant l'intervention ?
  - a. Remplacer la dent retirée
  - b. Anesthésier la zone
  - c. Nettoyer la bouche du patient
  - d. Aider à contrôler le saignement dans la zone opérée

1-c 2-d 3-c 4-d

## 2. Lees de dialoog en beantwoord de vragen.

Extraction dentaire et saignement chez un patient sous anticoagulants

Tandextractie en bloeding bij een patiënt die anticoagulantia gebruikt

**Patient:** Docteur, je prends des anticoagulants. Est-ce que je vais beaucoup saigner ? **Dokter, ik gebruik bloedverdunners. Zal ik veel bloeden?**

<b>Dentiste:</b> Ne vous inquiétez pas, nous prendrons toutes les précautions nécessaires pour avoir une bonne hémostase.	(Maakt u zich geen zorgen, we nemen alle nodige voorzorgsmaatregelen om een goede hemostase te bereiken.)
<b>Patient:</b> Quel type d'anesthésie allez-vous utiliser ?	(Welk soort verdoving gaat u gebruiken?)
<b>Dentiste:</b> Nous utiliserons une anesthésie locale à base d'articaïne. Cela va aussi aider à réduire le saignement dans la zone chirurgicale.	(We gebruiken een lokale verdoving met articaïne. Dat zal ook helpen het bloeden in het operatiegebied te verminderen.)
<b>Patient:</b> Et comment allez-vous contrôler le saignement ?	(En hoe gaat u het bloeden beheersen?)
<b>Dentiste:</b> Nous placerons une éponge hémostatique dans l'alvéole et nous ferons quelques points de suture pour assurer une bonne coagulation.	(We plaatsen een hemostatisch sponsje in het alveolairvak en zetten enkele hechtingen om een goede stolling te bevorderen.)
<b>Patient:</b> Et après l'intervention ?	(En na de ingreep?)
<b>Dentiste:</b> Je mettrai une compresse que vous devrez mordre pendant trente minutes.	(Ik leg een kompres klaar dat u dertig minuten moet dichtbijten.)
<b>Patient:</b> Que dois-je faire si je saigne encore ?	(Wat moet ik doen als ik nog steeds bloed?)
<b>Dentiste:</b> Vous remettez une autre compresse et vous mordez encore pendant trente minutes. Si le saignement persiste, vous revenez à la clinique.	(U plaatst een nieuw kompres en bijt opnieuw dertig minuten. Als de bloeding aanhoudt, komt u terug naar de kliniek.)
<b>Patient:</b> Merci beaucoup, docteur.	(Hartelijk dank, dokter.)
<b>Dentiste:</b> Je pourrai aussi placer une compresse avec de l'Amchafibrine pour arrêter le saignement. Ne vous inquiétez pas.	(Ik kan ook een kompres met Amchafibrine aanbrengen om het bloeden te stoppen. Maak u geen zorgen.)

1. Que prend le patient comme médicament ?
  - a. Il prend des somnifères.
  - b. Il prend des anticoagulants.
  - c. Il prend des antibiotiques.
  - d. Il prend des antalgiques.
  
2. Quel type d'anesthésie la dentiste va-t-elle utiliser ?
  - a. Une anesthésie locale à base d'articaïne.
  - b. Une sédation intraveineuse profonde.
  - c. Aucune anesthésie, seulement une compresse froide.
  - d. Une anesthésie générale à l'hôpital.

**1-b 2-a**

### **3. Quels sont les facteurs de risque et les mesures préventives que vous discutez avec un patient avant une extraction dentaire afin de réduire le risque de complications postopératoires ?**

1. <https://www.dentaly.org/extraction-dentaire-tout-savoir-avant-de-se-faire-arracher-une-dent/>