

Tandheelkunde 9.1 Questions préopératoires et instructions post-opératoires

Preoperatieve vragen en postoperatieve instructies



1. Pourquoi le dentiste anesthésie-t-il la zone avant l'extraction ?
 - a. Pour que l'intervention soit indolore pour le patient
 - b. Pour rendre la dent plus blanche
 - c. Pour éviter toute infection
 - d. Pour empêcher le patient de parler pendant l'opération
2. Que fait le chirurgien après l'incision de la gencive ?
 - a. Il pose immédiatement un fil résorbable
 - b. Il donne un anesthésique oral au patient
 - c. Il retire la dent sans autre manipulation
 - d. Il soulève un petit volet gingival

1-a 2-d

2. Lees de dialoog en beantwoord de vragen.

Extraction dentaire et saignement chez un patient sous anticoagulants

Tandextractie en bloeding bij een patiënt die anticoagulantia gebruikt

- Patient:** Docteur, je prends des anticoagulants. Est-ce que je vais beaucoup saigner ?
(Dokter, ik gebruik bloedverdunners. Zal ik veel bloeden?)
- Dentiste:** Ne vous inquiétez pas, nous prendrons toutes les précautions nécessaires pour avoir une bonne hémostase.
(Maakt u zich geen zorgen, we nemen alle nodige voorzorgsmaatregelen om een goede hemostase te bereiken.)
- Patient:** Quel type d'anesthésie allez-vous utiliser ?
(Welk soort verdoving gaat u gebruiken?)
- Dentiste:** Nous utiliserons une anesthésie locale à base d'articaine. Cela va aussi aider à réduire le saignement dans la zone chirurgicale.
(We gebruiken een lokale verdoving met articaine. Dat zal ook helpen het bloeden in het operatiegebied te verminderen.)
- Patient:** Et comment allez-vous contrôler le saignement ?
(En hoe gaat u het bloeden beheersen?)
- Dentiste:** Nous placerons une éponge hémostatique dans l'alvéole et nous ferons quelques points de suture pour assurer une bonne coagulation.
(We plaatsen een hemostatisch sponsje in het alveolairvak en zetten enkele hechtingen om een goede stolling te bevorderen.)
- Patient:** Et après l'intervention ?
(En na de ingreep?)
- Dentiste:** Je mettrai une compresse que vous devrez mordre pendant trente minutes.
(Ik leg een kompres klaar dat u dertig minuten moet dichtbijten.)
- Patient:** Que dois-je faire si je saigne encore ?
(Wat moet ik doen als ik nog steeds bloed?)
- Dentiste:** Vous remettez une autre compresse et vous mordez encore pendant trente minutes. Si le saignement persiste, vous revenez à la clinique.
(U plaatst een nieuw kompres en bijt opnieuw dertig minuten. Als de bloeding aanhoudt, komt u terug naar de kliniek.)
- Patient:** Merci beaucoup, docteur.
(Hartelijk dank, dokter.)

Dentiste: Je pourrai aussi placer une compresse avec de l'Amchafibrine pour arrêter le saignement. Ne vous inquiétez pas.

(Ik kan ook een kompres met Amchafibrine aanbrengen om het bloeden te stoppen. Maak u geen zorgen.)

1. Que prend le patient comme médicament ? *(Welk medicijn gebruikt de patiënt?)*
 - a. Il prend des antibiotiques.
 - b. Il prend des somnifères.
 - c. Il prend des anticoagulants.
 - d. Il prend des antalgiques.
2. Quel type d'anesthésie la dentiste va-t-elle utiliser ? *(Welk soort verdoving zal de tandarts gebruiken?)*
 - a. Aucune anesthésie, seulement une compresse froide.
 - b. Une sédation intraveineuse profonde.
 - c. Une anesthésie générale à l'hôpital.
 - d. Une anesthésie locale à base d'articaine.

1-c 2-d