

## Tandheelkunde 13 Spoedgevallen tandartspraktijk



- Veelvoorkomende tandheelkundige noodgevallen
- Simuleer een klinische noodsituatie met een nauwkeurige diagnose en behandelstappen

**Het abces**

**De pusfistel**

**De aften**

**De slechte adem**

**De tandvlesbloeding**

**Bijtwond bij een kind**

**Pijn door een cariës**

**De gebroken tand**

**De gebroken prothese**

**De loszittende kroon**

**De te hoge vulling**

**Wond door de prothese**

**De tandgevoeligheid**

**De tandmobiliteit**

**De nabloeding na extractie**

### 1. Scan de QR-code om de video te bekijken, of lees de tekst. (QR: Audio)



1. Waardoor krijgen veel volwassenen last van gevoelige tanden?
  - a. Door te weinig tandenpoetsen en nooit floss te gebruiken
  - b. Door elke dag een mondspoeling met alcohol te gebruiken
  - c. Door teruggetrokken tandvles, te hard poetsen of bepaalde eetgewoontes
  - d. Door alleen 's avonds water te drinken
2. Wat gebeurt er als het dentine bloot komt te liggen?
  - a. Er ontstaat geen scherpe pijn meer
  - b. Prikfels kunnen via de dentinetubuli de zenuw bereiken
  - c. De tand wordt vanzelf harder en sterker
  - d. Het tandvles groeit vanzelf weer over de tand

**1-c 2-b**

## 2.Oefeningen

### 1. Koppel de items die een verwante betekenis hebben.

- |                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| a. het abces            | 1. bloedend tandvlees    |
| b. de slechte adem      | 2. een holte met pus     |
| c. de tandvleesbloeding | 3. een vieze adem        |
| d. de gebroken tand     | 4. een tand die kapot is |



a-2 b-3 c-1 d-4

### 2. Spoedhulp bij de tandarts (praktijkbericht) (QR: Audio)



**Vul de lege plekken in:** abces, tandvleesbloeding, cariës, pusfistel, bijtwond, gebroken, nabloeding, loszittende

Tandartspraktijk Centrum – Spoedhulp

Bel ons bij hevige pijn of bij zwelling. Als het mogelijk is, geven we dezelfde dag een spoedafspraak. Vaak gaat het om pijn door (1) \_\_\_\_\_, een (2) \_\_\_\_\_ tand of een (3) \_\_\_\_\_ kroon. Bij zwelling met een vieze smaak kan er een (4) \_\_\_\_\_ zijn; soms is er een (5) \_\_\_\_\_ in het tandvlees. Na een extractie kan een (6) \_\_\_\_\_ optreden. Bij een (7) \_\_\_\_\_ bij een kind of bij een (8) \_\_\_\_\_ die niet stopt: neem direct contact op.

Wat kunt u thuis doen? Spoel voorzichtig met lauw water en poets zacht. Vermijd warmte op de pijnlijke plek. Bij gevoelige tanden kan te hard poetsen de klachten verergeren. Neem bij pijn zo nodig paracetamol volgens de bijsluiter. Bel 112 bij benauwdheid, snel toenemende zwelling of koorts.

1. Welke drie voorbeelden van oorzaken voor hevige tandpijn noemt de praktijk?  
\_\_\_\_\_
2. Welke twee dingen raadt de tekst aan om thuis te doen bij tandpijn of zwelling?  
\_\_\_\_\_

### 3. Luister naar het audiofragment en kies het juiste antwoord. (QR: Audio)

Waar Onwaar

- |  |                          |                          |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 1. De patiënt heeft kiespijn door een cariës en zijn tandvlees bloedt tijdens het poetsen. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. De patiënt ziet pus bij de pijnlijke plek, dus er is een pusfistel.                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. De spoedafspraak is vandaag om twee uur 's middags gepland.                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



#### 4. Kies de juiste oplossing

1. De patiënt \_\_\_\_\_ omdat hij plotseling veel pijn door cariës heeft.  
a. bel      b. belt      c. belde      d. bellen
2. Ik \_\_\_\_\_ meteen of het tandvlees nog bloedt na de extractie.  
a. kijken      b. keek      c. kijk      d. kijkt
3. De assistent \_\_\_\_\_ of de patiënt last heeft van slechte adem en een abces.  
a. vroeg      b. vraag      c. vraagt      d. vragen

1. belt 2. kijkt 3. vraagt

#### 5. Rollenspel - dialogen (QR: Audio)



##### Nabloeding na tand trekken

**Patiënt:** *Hallo, ik ben net thuis na het trekken van een kies en ik heb nog steeds een nabloeding. Is dat normaal?*

**Tandartsassistente:** *Een beetje bloed is normaal, maar bij aanhoudende bloedingen: bijt 30 minuten stevig op een gaasje en spoel niet met water.*

**Patiënt:** *Ik gebruik bloedverdunders en ik proef steeds bloed in mijn mond. Ik maak me zorgen.*

**Tandartsassistente:** *Als het na die 30 minuten nog bloedt, willen we u vandaag nog zien op de spoedpost; neem uw medicijnlijst mee.*

1. Waarom belt de patiënt de tandartspraktijk?

---

#### 6. Spreken: vertaal en beantwoord (QR: AI+)



*Kunt u mij vertellen sinds wanneer u last heeft? / Ik denk dat het gaat om ..., daarom adviseer ik ... / Als u hevige pijn of koorts heeft, neem dan direct contact op voor een spoedafpraak.*

1. Een patiënt belt voor een spoedafpraak omdat hij erge pijn heeft door cariës. Welke twee vragen stelt u en welk advies geeft u tot de afspraak?

---

2. Tijdens de controle ziet u een tandvleesbloeding en de patiënt zegt dat hij ook last heeft van een slechte adem. Wat zegt u tegen de patiënt en wat is de volgende stap?

---

## 7. Schrijven: E-mail (intern, tandartspraktijk) (QR: AI+)

**Onderwerp:** Spoedpatiënt vanmiddag

Hoi,

Ik had zojuist een man aan de telefoon met **hevige pijn door cariës** linksboven. Hij zegt dat de kies sinds de vulling van vorige week "hoog" aanvoelt en dat hij ook **tandvlesbloeding** heeft bij het poetsen. Geen koorts, wel gevoelig voor koud. Kun jij hem om 16:30 zien? Wat wil je dat ik alvast aan hem doorgeef?

Groet,

Lisa (balie)



**Schrijf een passende reactie:** *Kun je mij nog zeggen of de pijn constant is of alleen bij koud/warm? / Wil je dat ik tegen de patiënt zeg dat hij niet op die kant moet kauwen? / Ik kan hem om 16:30 inplannen, is dat oké?*

---

---

---