

Stomatologia 9.1 Questions préopératoires et instructions post-opératoires



Pytania przedoperacyjne i instrukcje pooperacyjne

<https://app.colanguage.com/pl/francuski/dialogi/questions-preoperatoires>

1. Obejrzyj wideo i odpowiedz na powiązane pytania.

Wideo: https://www.youtube.com/watch?v=L7GO7Wi6l_S

Arracher une dent de sagesse	(Usunięcie ósemki)	Un levier	(Dźwignia)
Anesthésier	(Znieczulenie)	Les racines	(Korzenie)
Incision de la gencive	(Nacięcie dziąsła)	Enlever les débris osseux	(Usunięcie odłamków kostnych)
La dent est enfouie dans l'os	(Ząb jest zatopiony w kości)	Une éponge hémostatique	(Gąbka hemostatyczna)
Creuser l'os pour accéder à la dent	(Usunięcie części kości, aby dostać się do zęba)	Un fil résorbable	(Nici wchłaniające)

- Pourquoi le dentiste anesthésie-t-il la zone avant l'extraction ?
 - Pour éviter toute infection
 - Pour rendre la dent plus blanche
 - Pour empêcher le patient de parler pendant l'opération
 - Pour que l'intervention soit indolore pour le patient
- Que fait le chirurgien après l'incision de la gencive ?
 - Il soulève un petit volet gingival
 - Il retire la dent sans autre manipulation
 - Il donne un anesthésique oral au patient
 - Il pose immédiatement un fil résorbable
- Dans quel cas faut-il creuser l'os pour accéder à la dent ?
 - Quand le patient est allergique aux anesthésiques
 - Quand la dent est enfouie dans l'os
 - Quand la gencive est saine
 - Quand la dent est déjà sortie
- Quel est le rôle principal de l'éponge hémostatique pendant l'intervention ?
 - Anesthésier la zone
 - Remplacer la dent retirée
 - Aider à contrôler le saignement dans la zone opérée
 - Nettoyer la bouche du patient

1-d 2-a 3-b 4-c

2. Przeczytaj dialog i odpowiedz na pytania.

Extraction dentaire et saignement chez un patient sous anticoagulants

Usunięcie zęba i krwawienie u pacjenta przyjmującego antykoagulanty

Patient: Docteur, je prends des anticoagulants. Est-ce que je vais beaucoup saigner ? *(Doktorze, biorę antykoagulanty. Czy będę dużo krwawić?)*

Dentiste: Ne vous inquiétez pas, nous prendrons toutes les précautions nécessaires pour avoir une bonne hémostase.	(Proszę się nie niepokoić — podejmiemy wszystkie niezbędne środki, żeby zapewnić dobrą hemostazę.)
Patient: Quel type d'anesthésie allez-vous utiliser ?	(Jakiego rodzaju znieczulenie pani zastosuje?)
Dentiste: Nous utiliserons une anesthésie locale à base d'articaïne. Cela va aussi aider à réduire le saignement dans la zone chirurgicale.	(Zastosujemy znieczulenie miejscowe na bazie artykainy. Pomoże to też zmniejszyć krewotok w obszarze zabiegowym.)
Patient: Et comment allez-vous contrôler le saignement ?	(A jak będziecie kontrolować krewotok?)
Dentiste: Nous placerons une éponge hémostatique dans l'alvéole et nous ferons quelques points de suture pour assurer une bonne coagulation.	(Włożymy gąbkę hemostatyczną do zębodołu i założymy kilka szwów, żeby zapewnić prawidłowe krzepnięcie.)
Patient: Et après l'intervention ?	(A po zabiegu?)
Dentiste: Je mettrai une compresse que vous devrez mordre pendant trente minutes.	(Dam kompres, który będzie pan musiał przygryzać przez trzydzieści minut.)
Patient: Que dois-je faire si je saigne encore ?	(Co mam zrobić, jeśli nadal będę krewawić?)
Dentiste: Vous remettez une autre compresse et vous mordez encore pendant trente minutes. Si le saignement persiste, vous revenez à la clinique.	(Położyć pan kolejny kompres i przygryź go ponownie przez trzydzieści minut. Jeśli krewotok się utrzyma, proszę wrócić do kliniki.)
Patient: Merci beaucoup, docteur.	(Bardzo dziękuję, doktorze.)
Dentiste: Je pourrai aussi placer une compresse avec de l'Amchafibrine pour arrêter le saignement. Ne vous inquiétez pas.	(Mogę też założyć kompres nasączony Amchafibriną, żeby zatrzymać krewotok. Proszę się nie martwić.)

1. Que prend le patient comme médicament ?

- a. Il prend des antibiotiques.
- b. Il prend des anticoagulants.
- c. Il prend des antalgiques.
- d. Il prend des somnifères.

2. Quel type d'anesthésie la dentiste va-t-elle utiliser ?

- a. Aucune anesthésie, seulement une compresse froide.
- b. Une anesthésie locale à base d'articaïne.
- c. Une anesthésie générale à l'hôpital.
- d. Une sédatrice intraveineuse profonde.

1-b 2-b

3. Quels sont les facteurs de risque et les mesures préventives que vous discutez avec un patient avant une extraction dentaire afin de réduire le risque de complications postopératoires ?

1. <https://www.dentaly.org/extraction-dentaire-tout-savoir-avant-de-se-faire-arracher-une-dent/>