

Stomatologia 9.1 Questions préopératoires et instructions post-opératoires

Pytania przedoperacyjne i instrukcje pooperacyjne



1. Obejrzyj wideo i odpowiedz na powiązane pytania.

Wideo: https://www.youtube.be/L7GO7Wi6l_s

Arracher une dent de sagesse (Usunięcie ósemki)

Anesthésier (Znieczulenie)

Incision de la gencive (Nacięcie dziąsła)

La dent est enfouie dans l'os (Ząb jest zatopiony w kości)

Creuser l'os pour accéder à la dent (Usunięcie części kości, aby dostać się do zęba)

Un levier (Dźwignia)

Les racines (Korzenie)

Enlever les débris osseux (Usunięcie odłamków kostnych)

Une éponge hémostatique (Gąbka hemostatyczna)

Un fil résorbable (Nici wchłaniałne)

1. Pourquoi le dentiste anesthésie-t-il la zone avant l'extraction ?

- a. Pour empêcher le patient de parler pendant l'opération
- b. Pour rendre la dent plus blanche
- c. Pour que l'intervention soit indolore pour le patient
- d. Pour éviter toute infection

2. Que fait le chirurgien après l'incision de la gencive ?

- a. Il pose immédiatement un fil résorbable
- b. Il donne un anesthésique oral au patient
- c. Il soulève un petit volet gingival
- d. Il retire la dent sans autre manipulation

3. Dans quel cas faut-il creuser l'os pour accéder à la dent ?

- a. Quand la dent est déjà sortie
- b. Quand la dent est enfouie dans l'os
- c. Quand le patient est allergique aux anesthésiques
- d. Quand la gencive est saine

4. Quel est le rôle principal de l'éponge hémostatique pendant l'intervention ?

- a. Aider à contrôler le saignement dans la zone opérée
- b. Remplacer la dent retirée
- c. Nettoyer la bouche du patient
- d. Anesthésier la zone

1-c 2-c 3-b 4-a

2. Przeczytaj dialog i odpowiedz na pytania.

Extraction dentaire et saignement chez un patient sous anticoagulants

Usunięcie zęba i krwawienie u pacjenta przyjmującego antykoagulanty

Patient: Docteur, je prends des anticoagulants. Est-ce que je vais beaucoup saigner ? (Doktorze, biorę antykoagulanty. Czy będę dużo krwawić?)

Dentiste: Ne vous inquiétez pas, nous prendrons toutes les précautions nécessaires pour avoir une bonne hémostasie.	<i>(Proszę się nie niepokoić — podejmiemy wszystkie niezbędne środki, żeby zapewnić dobrą hemostazę.)</i>
Patient: Quel type d'anesthésie allez-vous utiliser ?	<i>(Jakiego rodzaju znieczulenie pani zastosuje?)</i>
Dentiste: Nous utiliserons une anesthésie locale à base d'articaine. Cela va aussi aider à réduire le saignement dans la zone chirurgicale.	<i>(Zastosujemy znieczulenie miejscowe na bazie artykainy. Pomoże to też zmniejszyć krwawienie w obszarze zabiegowym.)</i>
Patient: Et comment allez-vous contrôler le saignement ?	<i>(A jak będziecie kontrolować krwawienie?)</i>
Dentiste: Nous placerons une éponge hémostatique dans l'alvéole et nous ferons quelques points de suture pour assurer une bonne coagulation.	<i>(Włożymy gąbkę hemostatyczną do zębodołu i założymy kilka szwów, żeby zapewnić prawidłowe krzepnięcie.)</i>
Patient: Et après l'intervention ?	<i>(A po zabiegu?)</i>
Dentiste: Je mettrai une compresse que vous devrez mordre pendant trente minutes.	<i>(Dam kompres, który będzie pan musiał przygryzać przez trzydzieści minut.)</i>
Patient: Que dois-je faire si je saigne encore ?	<i>(Co mam zrobić, jeśli nadal będę krwawić?)</i>
Dentiste: Vous remettez une autre compresse et vous mordez encore pendant trente minutes. Si le saignement persiste, vous revenez à la clinique.	<i>(Połóż pan kolejny kompres i przygryź go ponownie przez trzydzieści minut. Jeśli krwawienie się utrzyma, proszę wrócić do kliniki.)</i>
Patient: Merci beaucoup, docteur.	<i>(Bardzo dziękuję, doktorze.)</i>
Dentiste: Je pourrai aussi placer une compresse avec de l'Amchafibrine pour arrêter le saignement. Ne vous inquiétez pas.	<i>(Mogę też założyć kompres nasączony Amchafibriną, żeby zatrzymać krwawienie. Proszę się nie martwić.)</i>

1. Que prend le patient comme médicament ?
 - a. Il prend des anticoagulants.
 - b. Il prend des antibiotiques.
 - c. Il prend des antalgiques.
 - d. Il prend des somnifères.
2. Quel type d'anesthésie la dentiste va-t-elle utiliser ?
 - a. Une anesthésie locale à base d'articaine.
 - b. Une anesthésie générale à l'hôpital.
 - c. Aucune anesthésie, seulement une compresse froide.
 - d. Une sédation intraveineuse profonde.

1-a 2-a