

B2.44.1 Malaise vagal

Omdlenie wazowagalne



Le **malaise vagal** survient parfois quand on a des étoiles devant les yeux ou des **vertiges**. Il est lié au **nerf vague** : s'il est trop stimulé, notamment par la chaleur ou une station debout prolongée, le rythme cardiaque peut ralentir. *Mais* ce malaise n'est pas une hypoglycémie, car le corps régule généralement le **taux de sucre**. En cas de symptômes, il faut *s'asseoir*, attendre, et *donc* consulter si cela persiste.

Omdlenie wazowagalne czasem pojawia się, gdy ma się gwiazdy przed oczami lub **zawroty głowy**. Jest związane z **nerwem błędnym**: jeśli jest zbyt mocno pobudzony, zwłaszcza przez gorąco lub długotrwałe stanie, rytm serca może zwolnić. Ale to omdlenie nie jest hipoglikemią, ponieważ organizm zazwyczaj reguluje **poziom cukru**. W razie objawów trzeba usiąść, poczekać i zatem skonsultować się, jeśli to się utrzymuje.

1. Quelle explication décrit le mieux l'origine d'un malaise vagal ?

- | | |
|---|--|
| a. Une crise d'anxiété qui accélère durablement le cœur | b. Une stimulation excessive du nerf vague qui ralentit trop le rythme cardiaque |
| c. Une infection respiratoire qui provoque de la fièvre et des frissons | d. Une baisse brutale du taux de sucre due à un petit-déjeuner oublié |

2. Quel facteur peut favoriser un malaise vagal ?

- | | |
|---|------------------------------------|
| a. Rester debout longtemps ou subir une forte chaleur | b. Boire un café après le déjeuner |
| c. Dormir plus de dix heures d'affilée | d. Prendre un antibiotique à jeun |

1-b 2-a

2. Bliska Ci osoba mdleje w metrze z powodu omdlenia wazowagalnego i musisz pomóc jej dojść do siebie.

Zadanie: Rédige un message à ton proche avec cinq conseils concrets pour se rétablir vite et précise quand consulter un médecin.

URL: Comment réagir en cas de malaise vagal ?

Use in your answer: malaise vagal / perte de connaissance / allongez-vous / surélevez vos jambes / repris connaissance / consultez un médecin