

Medicina dentária 9.1 Questions préopératoires et instructions postopératoires

Perguntas pré-operatórias e instruções pós-operatórias



1. Pourquoi le dentiste anesthésie-t-il la zone avant l'extraction ?
 - a. Pour éviter toute infection
 - b. Pour que l'intervention soit indolore pour le patient
 - c. Pour rendre la dent plus blanche
 - d. Pour empêcher le patient de parler pendant l'opération
2. Que fait le chirurgien après l'incision de la gencive ?
 - a. Il retire la dent sans autre manipulation
 - b. Il pose immédiatement un fil résorbable
 - c. Il soulève un petit volet gingival
 - d. Il donne un anesthésique oral au patient

1-b 2-c

2. Leia o diálogo e responda às perguntas.

Extraction dentaire et saignement chez un patient sous anticoagulants

Extração dentária e sangramento em um paciente sob anticoagulantes

- Patient:** Docteur, je prends des anticoagulants. Est-ce que je vais beaucoup saigner ? *(Doutor, eu tomo anticoagulantes. Vou sangrar muito?)*
- Dentiste:** Ne vous inquiétez pas, nous prendrons toutes les précautions nécessaires pour avoir une bonne hémostase. *(Não se preocupe, tomaremos todas as precauções necessárias para obter uma boa hemostasia.)*
- Patient:** Quel type d'anesthésie allez-vous utiliser ? *(Que tipo de anestesia você vai usar?)*
- Dentiste:** Nous utiliserons une anesthésie locale à base d'articaine. Cela va aussi aider à réduire le saignement dans la zone chirurgicale. *(Usaremos uma anestesia local à base de articaina. Isso também vai ajudar a reduzir o sangramento na área cirúrgica.)*
- Patient:** Et comment allez-vous contrôler le saignement ? *(E como você vai controlar o sangramento?)*
- Dentiste:** Nous placerons une éponge hémostatique dans l'alvéole et nous ferons quelques points de suture pour assurer une bonne coagulation. *(Colocaremos uma esponja hemostática no alvéolo e faremos alguns pontos de sutura para garantir uma boa coagulação.)*
- Patient:** Et après l'intervention ? *(E depois da intervenção?)*
- Dentiste:** Je mettrai une compresse que vous devrez mordre pendant trente minutes. *(Vou colocar uma compressa que você deverá morder por trinta minutos.)*
- Patient:** Que dois-je faire si je saigne encore ? *(O que devo fazer se eu ainda sangrar?)*
- Dentiste:** Vous remettez une autre compresse et vous mordez encore pendant trente minutes. Si le saignement persiste, vous revenez à la clinique. *(Você coloca outra compressa e morde novamente por trinta minutos. Se o sangramento persistir, você volta à clínica.)*
- Patient:** Merci beaucoup, docteur. *(Muito obrigado, doutor.)*

Dentiste: Je pourrai aussi placer une compresse avec de l'Amchafibrine pour arrêter le saignement. Ne vous inquiétez pas. *(Também poderei colocar uma compressa com Amchafibrine para parar o sangramento. Não se preocupe.)*

1. Que prend le patient comme médicament ? *(Que medicamento o paciente toma?)*
 - a. Il prend des anticoagulants.
 - b. Il prend des antalgiques.
 - c. Il prend des somnifères.
 - d. Il prend des antibiotiques.
2. Quel type d'anesthésie la dentiste va-t-elle utiliser ? *(Que tipo de anestesia a dentista vai usar?)*
 - a. Une anesthésie générale à l'hôpital.
 - b. Une anesthésie locale à base d'articaine.
 - c. Aucune anesthésie, seulement une compresse froide.
 - d. Une sédation intraveineuse profonde.

1-a 2-b