

Medicina dentária 9 Extractions et instructions postopératoires



- Indications et procédure des extractions (y compris les troisièmes molaires)
- Donner des instructions après l'extraction pour prévenir les complications.

Les compresses stériles	<i>(Compressas estéreis)</i>	Le fil de suture	<i>(Fio de sutura)</i>
La troisième molaire	<i>(Terceiro molar)</i>	Porte-aiguille	<i>(Porta-agulhas)</i>
La fraise chirurgicale	<i>(Broca cirúrgica)</i>	Le porte-lame bistouri	<i>(Cabo de lâmina (bisturi))</i>
La curette alvéolaire	<i>(Cureta alveolar)</i>	L'avulsion	<i>(Avulsão)</i>
Les daviers dentaires	<i>(Espelhos dentários)</i>	L'élévateur	<i>(Elevador)</i>
Les ciseaux	<i>(Tesouras)</i>	Lambeau	<i>(Retalho)</i>
Éponge hémostatique	<i>(Esponja hemostática)</i>	Les consignes post-op	<i>(Instruções pós-operatórias)</i>

1. Digitalize o código QR para ver o vídeo, ou leia o texto. (QR: Áudio)



1. Pourquoi le dentiste anesthésie-t-il la zone avant l'extraction ?
 - a. Pour que l'intervention soit indolore pour le patient
 - b. Pour empêcher le patient de parler pendant l'opération
 - c. Pour éviter toute infection
 - d. Pour rendre la dent plus blanche
2. Que fait le chirurgien après l'incision de la gencive ?
 - a. Il retire la dent sans autre manipulation
 - b. Il donne un anesthésique oral au patient
 - c. Il soulève un petit volet gingival
 - d. Il pose immédiatement un fil résorbable

1-a 2-c

2.Exercícios

1. Associe os itens que têm um significado relacionado.

- | | |
|----------------------------|--|
| a. les consignes post-op | 1. l'extraction d'une dent |
| b. l'avulsion | 2. les instructions après l'extraction |
| c. la troisième molaire | 3. des compresses propres |
| d. les compresses stériles | 4. la dent de sagesse |

a-2 b-1 c-4 d-3



2. Consultório dentário – Extração: instruções após o procedimento (QR: Áudio)



Preencha as lacunas: troisième molaire, éponge hémostatique, cabinet, avulsion, élévateur, lambeau, compresse stérile, daviers dentaires

Au cabinet, une extraction ((1) _____) est proposée quand une dent est très abîmée, infectée ou quand une (2) _____ n'a pas assez de place. Pendant l'intervention, la zone est anesthésiée. Le praticien peut soulever un petit (3) _____ de gencive et utiliser un (4) _____ et des (5) _____ pour retirer la dent. La zone est ensuite rincée et une (6) _____ peut être placée si nécessaire.

Après l'extraction, mordez une (7) _____ pendant 30 minutes. Ne rincez pas la bouche et ne crachez pas pendant 24 heures pour éviter un saignement. Évitez l'alcool, le tabac et les boissons chaudes. Mangez tiède et des aliments mous du côté opposé. Si le saignement continue malgré une nouvelle compresse, ou si la douleur augmente après deux jours, contactez le (8) _____ .

No consultório, uma extração (avulsão) é proposta quando um dente está muito danificado, infectado ou quando um terceiro molar não tem espaço suficiente. Durante o procedimento, a área é anestesiada. O profissional pode levantar um pequeno retalho de gengiva e usar um elevador e fórceps dentários para remover o dente. Em seguida, a área é enxaguada e uma esponja hemostática pode ser colocada, se necessário.


Após a extração, morda uma compressa estéril por 30 minutos. Não enxágue a boca e não cuspa durante 24 horas para evitar sangramento. Evite álcool, tabaco e bebidas quentes. Coma morno e alimentos macios do lado oposto. Se o sangramento continuar apesar de uma nova compresse, ou se a dor aumentar após dois dias, entre em contato com o consultório.

(1) avulsion, (2) troisième molaire, (3) lambeau, (4) élévateur, (5) daviers dentaires, (6) éponge hémostatique, (7) compresse stérile, (8) cabinet

1. Dans quels cas le cabinet propose-t-il une extraction ? Donnez deux raisons.

2. Quelles sont les consignes à suivre après l'extraction pour éviter des complications et quand faut-il recontacter le cabinet ?

3. Ouça o fragmento de áudio e escolha a resposta correta. (QR: Áudio)

	Verdadeiro	Falso	
1. La dentiste demande au patient de garder une compresse serrée entre les dents pendant une demi-heure.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. Le patient doit se rincer la bouche tout de suite après l'extraction pour nettoyer la plaie.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. S'il y a une fièvre ou une douleur importante, le patient doit contacter le cabinet.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

1-V 2-X 3-V

4. Escolha a solução correta

- Avant l'avulsion de la troisième molaire, vous _____ la procédure au patient. *(Antes da avulsão do terceiro molar, você explica o procedimento ao paciente.)*
a. expliquons b. expliquez c. expliquait d. expliquez
 - Après l'extraction, vous _____ une compresse stérile sur la plaie et le patient la mord. *(Após a extração, você coloca uma compressa estéril sobre a ferida e o paciente a morde.)*
a. mettez b. mets c. mettent d. mettiez
 - Si le patient saigne encore, vous lui _____ de garder la compresse stérile pendant 30 minutes. *(Se o paciente ainda estiver sangrando, você pede que ele mantenha a compressa estéril por 30 minutos.)*
a. demande b. demandiez c. demandez lui d. demandez
1. expliquez 2. mettez 3. demandez

5. Roleplay - diálogos (QR: Áudio)

Extraction troisième molaire

- Dr Martin (chirurgien dentiste):** *Sophie, on va faire l'avulsion de la troisième molaire en bas à droite : prépare les daviers dentaires et l'élevateur, s'il te plaît. (Sofia, vamos fazer a avulsão do terceiro molar inferior direito: prepare os fórceps dentários e o elevador, por favor.)*
- Sophie (assistante dentaire):** *D'accord docteur, je mets aussi des compresses stériles et une éponge hémostatique sur la tablette. (Certo, doutor, vou colocar também compressas estéreis e uma esponja hemostática na bandeja.)*
- Dr Martin (chirurgien dentiste):** *Très bien, je vais réaliser un petit lambeau : passe moi le porte lame bistouri et la fraise chirurgicale. (Muito bem, vou realizar um pequeno retalho: passe-me o cabo de bisturi e a broca cirúrgica.)*
- Sophie (assistante dentaire):** *C'est prêt, et je tiens le fil de suture avec le porte aiguille à côté au cas où. (Está pronto, e deixo o fio de sutura com o porta-agulhas ao lado, caso seja necessário.)*



1. Quels instruments le Dr Martin demande-t-il à Sophie ?
-

6. Falar: traduzir e responder (QR: IA+)

Avant l'avulsion, je vérifie si vous avez... / Après l'extraction, il faut... / Si ça saigne, mordez sur une compresse stérile.



1. Vous préparez l'avulsion d'une troisième molaire : quelles questions simples posez-vous au patient avant de commencer ?
-
2. Après une extraction, quelles consignes post-opératoires importantes donnez-vous pour éviter un saignement ou une douleur ?
-

7. Escrita: Email professionnel (QR: IA+)

Bonjour,

C'est Mme Martin. On m'a fait l'**avulsion** d'une **troisième molaire** hier à 16h. J'ai bien mordu la **compresse** pendant 30 minutes, mais ce matin je vois encore un peu de sang. J'ai aussi un gonflement et j'ai peur d'infecter la plaie.

Que dois-je faire à la maison ? Est-ce normal ?

Merci,

Mme Martin



Escreva uma resposta apropriada: *Merci pour votre message. Après l'extraction, il est normal que... / Si vous saignez encore, vous pouvez... / Si le saignement augmente ou si vous avez de la fièvre, appelez-nous au...*
