

Medicina dentária 9.1 Preoperatieve vragen en postoperatieve instructies

Perguntas pré-operatórias e instruções pós-operatórias



1. Wat is het doel van de afspraak bij de specialist?
 - a. Een beugel laten plaatsen
 - b. Een verstandskies laten verwijderen
 - c. Een controle van het gebit
 - d. Een gaatje vullen in een kies
2. Welke verdoving wordt gebruikt tijdens de behandeling?
 - a. Plaatselijke verdoving met een paar prikjes
 - b. Een verdovende zalf op het tandvlees
 - c. Algehele narcose in het ziekenhuis
 - d. Een pijnstiller in tabletvorm

1-b 2-a

2. Leia o diálogo e responda às perguntas.

Extractie en bloedverdunners

Extração e anticoagulantes

- Patiënt:** Dokter, ik gebruik bloedverdunners. Ga ik dan veel bloeden? *(Doutora, eu uso anticoagulantes. Vou sangrar muito?)*
- Tandarts:** Maak u zich geen zorgen; we nemen alle voorzorgsmaatregelen om het bloeden goed te stoppen. *(Não se preocupe; tomamos todas as medidas de precaução para estancar bem o sangramento.)*
- Patiënt:** Welke verdoving gaat u gebruiken? *(Que anestesia a senhora vai usar?)*
- Tandarts:** We geven een lokale verdoving met articaïne. Dat helpt ook om het gebied minder te laten bloeden. *(Vamos aplicar uma anestesia local com articaína. Isso também ajuda a reduzir o sangramento na área.)*
- Patiënt:** En hoe gaat u het bloeden tijdens de extractie stoppen? *(E como a senhora vai parar o sangramento durante a extração?)*
- Tandarts:** We plaatsen een speciaal hemostatisch sponsje in de holte en we zetten een paar hechtingen om alles goed te sluiten. *(Vamos colocar uma esponja hemostática especial na cavidade e daremos alguns pontos para fechar tudo adequadamente.)*
- Patiënt:** En wat gebeurt er na de ingreep? *(E o que acontece depois do procedimento?)*
- Tandarts:** Ik leg een steriel gaasje op de wond. U moet daar dertig minuten stevig op bijten. *(Vou colocar uma gaze estéril sobre a ferida. O senhor deve morder firmemente nela por trinta minutos.)*
- Patiënt:** Wat moet ik doen als het toch blijft bloeden? *(O que devo fazer se ainda assim continuar sangrando?)*
- Tandarts:** Plaats dan een nieuw steriel gaasje en bijt weer dertig minuten. Als het dan nog niet stopt, komt u terug naar de kliniek. *(Então coloque uma nova gaze estéril e morda novamente por trinta minutos. Se ainda assim não parar, volte à clínica.)*
- Patiënt:** Heel erg bedankt, dokter. *(Muito obrigado, doutora.)*

Tandarts: Graag gedaan. We plaatsen ook een compres met een product dat Amchafibrine heet om het bloeden extra te stoppen. Maak u geen zorgen.

(De nada. Também vamos colocar um compressa com um produto chamado Amchafibrine para ajudar ainda mais a estancar o sangramento. Não se preocupe.)

1. Waar is de patiënt bang voor? *(Do que o paciente tem medo?)*
 - a. Voor een infectie door de alveolaire curette
 - b. Voor veel bloeding tijdens de extractie
 - c. Voor pijn door de verdoving met articaïne
 - d. Voor schade door de chirurgische boor aan de verstandskies
2. Welke verdoving gebruikt de tandarts? *(Que anestesia a dentista usa?)*
 - a. Een algehele narcose met een lipspreider
 - b. Een lokale verdoving met articaïne
 - c. Geen verdoving, alleen een hemostatisch sponsje
 - d. Een verdoving gecombineerd met een steriel gaasje

1-b 2-b