

Medicina dentária 13 Spoedgevallen tandartspraktijk



- Veelvoorkomende tandheelkundige noodgevallen
- Simuleer een klinische noodsituatie met een nauwkeurige diagnose en behandelstappen

Het abces	<i>(O abscesso)</i>	De slechte adem	<i>(O mau hálito)</i>
De pusfistel	<i>(A fistula de pus)</i>	De aften	<i>(As aftas)</i>
Pijn door een cariës	<i>(Dor causada por cárie)</i>	Wond door de prothese	<i>(Ferida causada pela prótese)</i>
De gebroken tand	<i>(O dente quebrado)</i>	De gebroken prothese	<i>(A prótese quebrada)</i>
De tandmobiliteit	<i>(A mobilidade dentária)</i>	De loszittende kroon	<i>(A coroa solta)</i>
De tandgevoeligheid	<i>(A sensibilidade dentária)</i>	De te hoge vulling	<i>(Restauração muito alta)</i>
De tandvlesbloeding	<i>(Sangramento gengival)</i>	Bijtwond bij een kind	<i>(Ferida por mordida em criança)</i>
De nabloeding na extractie	<i>(Sangramento pós-extração)</i>		

1. Digitalize o código QR para ver o vídeo, ou leia o texto. (QR: Áudio)



1. Waardoor krijgen veel volwassenen last van gevoelige tanden?
 - a. Door elke dag een mondspoeling met alcohol te gebruiken
 - b. Door teruggetrokken tandvles, te hard poetsen of bepaalde eetgewoontes
 - c. Door te weinig tandenpoetsen en nooit floss te gebruiken
 - d. Door alleen 's avonds water te drinken
2. Wat gebeurt er als het dentine bloot komt te liggen?
 - a. Prikkel kunnen via de dentinetubuli de zenuw bereiken
 - b. Er ontstaat geen scherpe pijn meer
 - c. Het tandvles groeit vanzelf weer over de tand
 - d. De tand wordt vanzelf harder en sterker

1-b 2-a

2.Exercícios

1. Associe os itens que têm um significado relacionado.

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| a. het abces | 1. bloedend tandvlees |
| b. de slechte adem | 2. een vieze adem |
| c. de tandvleesbloeding | 3. een tand die kapot is |
| d. de gebroken tand | 4. een holte met pus |

a-4 b-2 c-1 d-3



2. Atendimento de urgência no dentista (comunicado da clínica) (QR:

Áudio)



Preencha as lacunas: gebroken, abces, tandvleesbloeding, bijtwond, cariës, nabloeding, loszittende, pusfistel

Tandartspraktijk Centrum – Spoedhulp

Bel ons bij hevige pijn of bij zwelling. Als het mogelijk is, geven we dezelfde dag een spoedafpraak. Vaak gaat het om pijn door (1) _____, een (2) _____ tand of een (3) _____ kroon. Bij zwelling met een vieze smaak kan er een (4) _____ zijn; soms is er een (5) _____ in het tandvlees. Na een extractie kan een (6) _____ optreden. Bij een (7) _____ bij een kind of bij een (8) _____ die niet stopt: neem direct contact op.

Wat kunt u thuis doen? Spoel voorzichtig met lauw water en poets zacht. Vermijd warmte op de pijnlijke plek. Bij gevoelige tanden kan te hard poetsen de klachten verergeren. Neem bij pijn zo nodig paracetamol volgens de bijsluiter. Bel 112 bij benauwdheid, snel toenemende zwelling of koorts.

Clínica Dentária Centro - Atendimento de urgência

Ligue para nós em caso de dor intensa ou inchaço. Se for possível, marcamos uma consulta de urgência no mesmo dia. Muitas vezes trata-se de dor causada por cárie, um dente partido ou uma coroa solta. Em caso de inchaço com um gosto desagradável, pode haver um abcesso; por vezes existe uma fistula de pus na gengiva. Após uma extração pode ocorrer uma hemorragia posterior. Em caso de ferida por mordida numa criança ou de uma hemorragia na gengiva que não para: entre em contacto imediatamente.

O que pode fazer em casa? Enxague cuidadosamente com água morna e escove suavemente. Evite calor no local doloroso. Em dentes sensíveis, escovar com demasiada força pode agravar as queixas. Em caso de dor, tome paracetamol se necessário, de acordo com o folheto informativo. Ligue 112 em caso de falta de ar, inchaço a aumentar rapidamente ou febre.

(1) cariës, (2) gebroken, (3) loszittende, (4) abces, (5) pusfistel, (6) nabloeding, (7) bijtwond, (8) tandvleesbloeding

1. Welke drie voorbeelden van oorzaken voor hevige tandpijn noemt de praktijk?

2. Welke twee dingen raadt de tekst aan om thuis te doen bij tandpijn of zwelling?

3. Ouça o fragmento de áudio e escolha a resposta correta. (QR: Áudio)

1. De patiënt heeft kiespijn door een cariës en zijn tandvlees bloedt tijdens het poetsen.
2. De patiënt ziet pus bij de pijnlijke plek, dus er is een pusfistel.
3. De spoedafpraak is vandaag om twee uur 's middags gepland.

Verdadeiro Falso

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



1-V 2-X 3-V

4. Escolha a solução correta

1. De patiënt _____ omdat hij plotseling veel pijn door cariës heeft. *(O paciente liga porque de repente tem muita dor por causa de cárie.)*
a. bel b. belde c. belt d. bellen
2. Ik _____ meteen of het tandvlees nog bloedt na de extractie. *(Eu verifico imediatamente se a gengiva ainda está sangrando após a extração.)*
a. kijken b. kijkt c. keek d. kijk
3. De assistent _____ of de patiënt last heeft van slechte adem en een abces. *(O assistente pergunta se o paciente sofre de mau hálito e um abscesso.)*
a. vraag b. vroeg c. vragen d. vraagt

1. belt 2. kijkt 3. vraagt

5. Roleplay - diálogos (QR: Áudio)

Nabloeding na tand trekken

Patiënt: *Hallo, ik ben net thuis na het trekken van een kies en ik heb nog steeds een nabloeding. Is dat normaal?*
(Olá, acabei de chegar em casa depois de extrair um molar e ainda estou com um sangramento. Isso é normal?)

Tandartsassistente: *Een beetje bloed is normaal, maar bij aanhoudende bloedingen: bijt 30 minuten stevig op een gaasje en spoel niet met water.*
(Um pouco de sangue é normal, mas em caso de sangramento persistente: morda firmemente uma gaze por 30 minutos e não enxágue com água.)

Patiënt: *Ik gebruik bloedverduunners en ik proef steeds bloed in mijn mond. Ik maak me zorgen.*
(Eu uso anticoagulantes e fico sentindo gosto de sangue na boca o tempo todo. Estou preocupado.)

Tandartsassistente: *Als het na die 30 minuten nog bloedt, willen we u vandaag nog zien op de spoedpost; neem uw medicijnlijst mee.*
(Se ainda estiver sangrando após esses 30 minutos, queremos atendê-lo ainda hoje no plantão de urgência; traga sua lista de medicamentos.)

1. Waarom belt de patiënt de tandartspraktijk?



6. Falar: traduzir e responder (QR: IA+)



*Kunt u mij vertellen sinds wanneer u last heeft? / Ik denk dat het gaat om ..., daarom adviseer ik ...
/ Als u hevige pijn of koorts heeft, neem dan direct contact op voor een spoedafspraken.*

1. Een patiënt belt voor een spoedafpraak omdat hij erge pijn heeft door cariës. Welke twee vragen stelt u en welk advies geeft u tot de afspraak?

2. Tijdens de controle ziet u een tandvleesbloeding en de patiënt zegt dat hij ook last heeft van een slechte adem. Wat zegt u tegen de patiënt en wat is de volgende stap?

7. Escrita: E-mail (interno, clínica odontológica) (QR: IA+)

Onderwerp: Spoedpatiënt vanmiddag

Hoi,

Ik had zojuist een man aan de telefoon met **hevige pijn door cariës** linksboven. Hij zegt dat de kies sinds de vulling van vorige week "hoog" aanvoelt en dat hij ook **tandvleesbloeding** heeft bij het poetsen. Geen koorts, wel gevoelig voor koud. Kun jij hem om 16:30 zien? Wat wil je dat ik alvast aan hem doorgeef?

Groet,

Lisa (balie)



Escreva uma resposta apropriada: *Kun je mij nog zeggen of de pijn constant is of alleen bij koud/warm?
/ Wil je dat ik tegen de patiënt zeg dat hij niet op die kant moet kauwen? / Ik kan hem om 16:30 inplannen, is dat oké?*
